DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

013215523 **Image available**
WPI Acc No: 2000-387397/200033

Related WPI Acc No: 2000-376451 XRAM Acc No: C00-117530

New anthranilic acid amide and isatoic acid derivatives useful in treatment of angiogenic disorders, e.g. tumors, psoriasis, arthritis and arteriosclerosis, and for prevention of vascular reocclusion

Patent Assignee: NOVARTIS AG (NOVS); SCHERING AG (SCHD)

Inventor: BOLD G; BRUEGGEN J; FERRARI S; FURET P; HUTH A; KRUEGER M; MANLEY P W; MENRAD A; MESTAN J; OTTOW E; SCHIRNER M; SEIDELMANN D; THIERAUCH K;

WOOD J M; SCHIRENER M; KRUGER M

Number of Countries: 091 Number of Patents: 014

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date W	eek	
WO 200027819	A2	20000518	WO 99EP8478	3 A	19991109	200033	В
AU 200010454	Α	20000529	AU 200010454	A	19991109	200041	
DE 19910396	A1	20000907	DE 1010396	Α	19990303	200044	
NO 200102245	Α	20010710	WO 99EP8478	Α	19991109	200148	
			NO 20012245	Α	20010507		
EP 1129074	A2	20010905	EP 99953967	Α	19991109	200151	
			WO 99EP8478	Α	19991109		
BR 9915553	Α	20010814	BR 9915553	Α	19991109	200154	
			WO 99EP8478	Α	19991109		
CZ 200101631	A3	20011017	WO 99EP8478	Α	19991109	200172	
			CZ 20011631	Α	19991109		
DE 19910396	C2	20011213	DE 1010396	Α	19990303	200201	
KR 2001075689	Α	20010809	KR 200170580	0 A	20010508	200211	
SK 200100607	A 3	20020107	WO 99EP8478	Α	19991109	200213	
			SK 2001607	Α	19991109		
CN 1325384	Α	20011205	CN 99813078	Α	19991109	200223	
HU 200104425	A2	20020328	WO 99EP8478	Α	19991109	200234	
			HU 20014425	Α	19991109		
JP 2002529452	W	20020910	WO 99EP8478	Α	19991109	200274	
			JP 2000580999) A	19991109		
ZA 200104673	Α	20021127	ZA 20014673	Α	20010607	200305	N

Priority Applications (No Type Date): DE 1010396 A 19990303; GB 9824579 A 19981110; ZA 20014673 A 20010607

(51) Internationale Patentklassifikation 7:

C07D 213/38, 409/12, 401/12, 213/40, 413/12, 401/12, 401/12, C07C 237/30, C07D 213/61, 417/12, 401/12, 401/12, 401/14, 401/12, 405/12, 417/12, 405/12, 265/26

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 00/27819

A2 (43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

18. Mai 2000 (18.05.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP99/08478

(22) Internationales Anmeldedatum: 9. November 1999 (09.11.99)

(30) Prioritätsdaten:

9824579.8 199 10 396.8

10. November 1998 (10.11.98) GB 3. März 1999 (03.03.99)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SCHER-ING AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Müllerstrasse 178, D-13342 Berlin (DE). NOVARTIS AKTIENGE-SELLSCHAFT [CH/CH]; Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HUTH, Andreas [DE/DE]: Dammweg 113, D-12437 Berlin (DE). SEIDELMANN, Dieter [DE/DE]; Stierstrasse 14, D-12159 Berlin (DE). THIERAUCH, Karl-Heinz [DE/DE]; Hochwildpfad 47, D-14169 Berlin (DE). BOLD, Guido [CH/CH]; Bleumatthöhe 16, CH-5073 Gipf-Oberfrick (CH). MANLEY, Paul, William [GB/CH]; Bruggweg 12, CH-4144 Arlesheim (CH). FURET, Pascal [FR/FR]; 24, rue du Riegelsbourg, F-68800 Thann (FR). WOOD, Jeanette, Marjorie [NZ/CH]; In den Kleematten 18, CH-4105 Biel-Benken (CH). MESTAN, Jürgen [DE/DE]; Simon-Veit-Gasse 4, D-79312 Emmendingen (DE). BRÜGGEN, Jose [DE/CH]; Schützengasse 5, CH-4125 Riehen (CH). FERRARI, Stefano [IT/CH]; Baselstrasse 63, CH-4132 Muttenz (CH). KRÜGER, Martin [DE/DE]; Heerrufer Weg 7 a, D-13465 Berlin (DE). OTTOW, Eckhard [DE/DE]; Moltkestrasse 48, D-12203 Berlin (DE). MENRAD, Andreas [DE/DE]; Allerstrasse 7, D-16515 Oranienburg (DE). SCHIRNER, Michael [DE/DE]; Birkenallee 12, D-13158 Berlin (DE).

- (74) Anwalt: MAGER, Knut; Müllerstrasse 178, D-13353 Berlin (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten: AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht

Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

- (54) Title: ANTRHRANILIC ACID AMIDES AND THE USE THEREOF AS MEDICAMENTS
- (54) Bezeichnung: ANTHRANILSÄUREAMIDE UND DEREN VERWENDUNG ALS ARZNEIMITTEL

(57) Abstract

The invention relates to anthranilic acid amides and the use thereof as medicaments for the treatment of diseases that are triggered by persistent angiogenesis, in addition to intermediate products in the production of anthranilic acid amides.

(57) Zusammenfassung

Es werden Anthranilsäureamide und deren Verwendung als Arzneimittel zur Behandlung von Erkrankungen, die durch persistente Angiogenese ausgelöst werden, sowie deren Zwischenprodukte zur Herstellung der Anthranilsäureamide beschrieben.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

1							
AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	
UA	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Senegal
AZ	Aserbaidschan	СB	Vereinigtes Königreich	MC	Моласо	SZ TD	Swasiland
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau		Tschad
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TG	Togo
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	•	TJ.	Tadschikistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	MIK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Republik Mazedonien Mali	TR	Türkei
BJ	Benin	Œ	Irland	MN		TT	Trinidad und Tobago
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mongolei	UA	Ukraine
BY	Belarus	IS	Island		Mauretanien	UG	Uganda
CA	Kanada	IT	Italien	MW	Malawi	US.	Vereinigte Staaten von
CF	Zentralafrikanische Republik	JP		MX	Mexiko		Amerika
CG	Kongo	JP KE	Japan	NE	Niger	. UZ	Usbekistan
CH	Schweiz	KG	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CI	Côte d'Ivoire		Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CM	Kamerun	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	ZW	Zimbabwe
CN			Korea	PL	Polen		
CU	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

WO 00/27819 PCT/EP99/08478

Anthranilsäureamide und deren Verwendung als Arzneimittel

Die Erfindung betrifft Anthranilsäureamide und deren Verwendung als Arzneimittel zur Behandlung von Erkrankungen, die durch persistente Angiogenese ausgelöst werden sowie deren Zwischenprodukte zur Herstellung der Anthranilsäureamide.

Persistente Angiogenese kann die Ursache für verschiedene Erkrankungen wie Psoriasis, Arthritis, wie rheumatoide Arthritis, Hämangioma, Angiofribroma, Augenerkrankungen, wie diabetische Retinopathie, Neovaskulares Glaukom, Nierenerkrankungen, wie Glomerulonephritis, diabetische Nephropatie, maligne Nephrosklerose, thrombische mikroangiopatische Syndrome, Transplantationsabstoßungen und Glomerulopathie, fibrotische Erkrankungen, wie Leberzirrhose, mesangialzellproliferative Erkrankungen und Artheriosklerose sein oder zu einer Verschlimmerung dieser Erkrankungen führen.

Eine direkte oder indirekte Inhibition des VEGF-Rezeptors kann zur Behandlung derartiger Erkrankungen und anderer VEGF-induzierter pathologischer Angiogenese und vaskularer permeabiler Bedingungen, wie Tumor-Vaskularisierung, verwendet werden. Beispielsweise ist bekannt, daß durch lösliche Rezeptoren und Antikörper gegen VEGF das Wachstum von Tumoren gehemmt werden kann.

25

Die persistente Angiogenese wird durch den Faktor VEGF über seinen Rezeptor induziert. Damit VEGF diese Wirkung entfalten kann ist es nötig, daß VEGF am Rezeptor bindet und eine Tyrosinphosphorylierung hervorgerufen wird.

Es sind bereits Phenyl-Anthranilamid-Derivate bekannt, die als Angiotensin Il-Antagonisten (EP 564 356) und als Entzündungshemmer und Anti-Ulcera-Verbindungen (U.S. 3,409,668) zur Anwendung kommen.

Es wurde nun gefunden, daß Verbindungen der allgemeinen Formel I

$$R^{5}$$
 R^{6}
 R^{7}
 R^{3}

in der

Α

für die Gruppe =NR2 steht,

W

für Sauerstoff, Schwefel, zwei Wasserstoffatome


oder die Gruppe =NR® steht,

Z

für die Gruppe =NR¹⁰ oder =N-, -N(R¹⁰)-(CH₂)_q-,

verzweigtes oder unverzweigtes C₁₋₆-Alkyl oder die

Gruppe



20

15

steht,

oder A, Z und R¹ gemeinsam die Gruppe

5 bilden,

10

20

m, n und o

für 1 – 6 steht

9 101

R_a, R_b, R_c, R_d, R_e, R_f unabhängig voneinander für Wasserstoff,

für 0 - 3 steht,

 C_{14} Alkyl oder die Gruppe =NR¹⁰ stehen und / oder R_a und oder R_b mit R_c und oder R_d oder R_c mit R_a und oder R_t eine Bindung bilden können, oder bis zu zwei der Reste R_a - R_t eine Brücke mit je bis zu 3 C-Atomen zu R^1 oder zu

R² schließen können,

15 X für die Gruppe =NR⁹ oder =N- steht,

Y für die Gruppe -(CH₂)_p steht,

p für 1-4 steht,

R¹ für unsubstituiertes oder gegebenenfalls ein-

oder mehrfach mit Halogen, C_{1-e}-Alkyl, ein-

oder mehrfach mit Halogen substituiertes C_{1.e}-

Alkyl oder C_{1.e}-Alkoxy substituiertes Aryl oder

Heteroaryl steht, mit Ausnahme der

Verbindungen, in denen Aryl unmittelbar an

	•	die =NR ² Gruppe in der Bedeutung von A
	•	gebunden ist,
	R^2	für Wasserstoff oder C _{1-e} -Alkyl steht oder mit
5		R_a - R_f von Z oder zu R_1 eine Brücke mit bis zu
		3 Ringgliedern bildet,
	R³	für unsubstituiertes oder gegebenenfalls ein-
		oder mehrfach mit Halogen, C ₁₋₈ -Alkyl, C ₁₋₆ -
		Alkoxy oder Hydroxy, substituiertes
10		monozyklisches oder bizyklisches Aryl oder
		Heteroaryl steht,
	R⁴ ,R⁵, R⁵ und R ⁷	unabhängig voneinander für Wasserstoff,
		Halogen oder unsubstituiertes oder
		gegebenenfalls ein- oder mehrfach mit
15		Halogen substituiertes C ₁₋₆ -Alkoxy, C ₁₋₆ -Alkyl,
		C ₁₋₈ -Carboxyalkyl stehen,
		oder R⁵ und R⁵ gemeinsam die Gruppe
		O_CH
		O CH ₂
		bilden,
20	R ⁸ , R ⁹ und R ¹⁰	unabhängig voneinander für Wasserstoff oder
		C _{1-a} -Alkyl stehen,
		bedeuten, sowie deren Isomeren und Salze,
		eine Tyrosinphosphorylierung bzw. die
		persistente Angiogenese stoppen und damit

das Wachstum und ein Ausbreiten von

Tumoren verhindern.

25

Falls R² eine Brücke zu R¹ bildet, entstehen Heterocyclen, an die R¹ ankondensiert ist. Beispielsweise seien genannt:

5

Stellen R_a, R_b, R_c, R_d, R_e, R_tunabhängig voneinander Wasserstoff oder C₁₋₄ Alkyl dar, so bildet Z eine Alkylkette.


Bilden R_a und/ oder R_b mit R_c und/ oder R_d oder R_c und/ oder R_d mit R_a und/ oder R_d eine Bindung, so steht Z für eine Alkenyl- oder Alkinylkette.

Bilden R_a - R_t eine Brücke mit sich selbst, so stellt Z eine Cycloalkyl- oder Cycloalkenylgruppe dar.

Bilden bis zu zwei der Reste R_a-R_r eine Brücke mit bis zu 3 C-Atomen zu R¹ aus, so ist Z zusammen mit R¹ ein benzo- oder hetarylkondensiertes (Ar) Cycloalkyl.

Schließt einer der Reste R_a - R_f zu R^2 eine Brücke, so bildet sich ein Stickstoffheterozyklus, der durch eine Gruppe von R^1 getrennt sein kann.

Beispielsweise seien genannt:



Unter Alkyl ist jeweils ein geradkettiger oder verzweigter Alkylrest, wie beispielsweise Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, sek. Butyl, Pentyl, Isopentyl oder Hexyl zu verstehen, wobei C₁₋₄-Alkylreste bevorzugt werden.

Unter Cycloalkyl ist jeweils Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl oder Cycloheptyl zu verstehen.

Unter Cycloalkenyl ist jeweils Cyclobutenyl, Cyclopentenyl, Cyclohexenyl, Cycloheptenyl zu verstehen, wobei die Anknüpfung sowohl an der Doppelbindung wie auch an den Einfachbindungen erfolgen kann.

Unter Halogen ist jeweils Fluor, Chlor, Brom oder Jod zu verstehen.

15

20

Die Alkenyl- und Alkinyl-Substituenten sind jeweils geradkettig oder verzweigt und enthalten 2 - 6, bevorzugt 2 - 4 C-Atome. Beispielsweise seien die folgenden Reste genannt: Vinyl, Propen-1-yl, Propen-2-yl, But-1-en-1-yl, But-1-en-2-yl, But-2-en-1-yl, But-2-en-2-yl, 2-Methyl-prop-2-en-1-yl, 2-Methyl-prop-1-en-1-yl, But-1-en-3-yl, Ethinyl, Prop-1-in-1-yl, But-1-in-1-yl, But-2-in-1-yl, But-3-en-1-yl, Allyl.

Der Arylrest hat jeweils 6 - 12 Kohlenstoffatome wie beispielsweise Naphthyl, Biphenyl und insbesondere Phenyl.

25

Der Heteroarylrest kann jeweils benzokondensiert sein. Beispielsweise seien als 5-Ringheteroaromaten genannt: Thiophen, Furan, Oxazol, Thiazol, Imidazol, Pyrazol und Benzoderivate davon und als 6-Ring-Heteroaromaten Pyridin, Pyrimidin, Triazin, Chinolin, Isochinolin und Benzoderivate, wobei bei benzokondensierten Heteroarylresten die Bindung sowohl am Heterozyklus als auch am Benzoring stehen kann.

Der Aryl- und der Heteroarylrest kann jeweils 1-, 2- oder 3-fach gleich oder verschieden substitutiert sein mit Halogen, C_{1-4} -Alkoxy, Nitro, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Cyano, SO_qR^5 oder C_{1-4} -Alkyl, wobei q für 0-2 steht.

5

10

15


Ist eine saure Funktion enthalten sind als Salze die physiologisch verträglichen Salze organischer und anorganischer Basen geeignet wie beispielsweise die gut löslichen Alkali- und Erdalkalisalze sowie N-Methyl-glukamin, Dimethyl-glukamin, Ethyl-glukamin, Lysin, 1,6-Hexadiamin, Ethanolamin, Glukosamin, Sarkosin, Serinol, Tris-hydroxy-methyl-amino-methan, Aminopropandiol, Sovak-Base, 1-Amino-2,3,4-butantriol.

Ist eine basische Funktion enthalten sind die physiologisch verträglichen Salze organischer und anorganischer Säuren geeignet wie Salzsäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure, Zitronensäure, Weinsäure u.a.

Als besonders wirksam haben sich solche Verbindungen der allgemeinen Formel I erwiesen, in der

20

20		
	A	für die Gruppe =NR² steht,
	. W	für Sauerstoff, Schwefel, zwei
		Wasserstoffatome oder die Gruppe =NR ⁸ ,
		steht,
25	Z	für die Gruppe =NR¹º, =N- oder
		-N(R ¹⁰)-(CH ₂) _q -, verzweigtes oder
		unverzweigtes C _{1-e} -Alkyl oder die Gruppe



steht, oder A, Z und R¹ gemeinsam die Gruppe

5

10

15

20

bilden,

m, n und o

q

 R_a , R_b , R_c , R_d , R_e , R_f

X

Y

р

 R^1

für 0 - 3 steht,

für 1 - 6 steht,

idi i — o stent,

unabhängig voneinander für Wasserstoff,

C₁₋₄ Alkyl oder die Gruppe =NR¹⁰ stehen,

für die Gruppe =NR9 oder =N- steht,

für die Gruppe -(CH2), steht,

für 1-4 steht,

für Phenyl, Pyridyl, 5-Chlor-2,3-

Dihydroindenyl, 2,3-Dihydroindenyl, Thienyl,

6-Fluor-1H-indol-3-yl, Naphthyl, 1,2,3,4-

Tetrahydronaphthyl, Benzo-1,2,5-oxadiazol,


6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphtyl

oder für ein-oder mehrfach mit C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 -

C₄- Alkoxy, Hydroxy, Halogen, Trifluormethyl,

substituiertes Phenyl oder Pyridyl oder für die

Gruppe



steht, wobei Phenyl, substituiertes Phenyl oder Naphthyl nicht unmittelbar an der =NR² Gruppe in der Bedeutung von A stehen,

	•	
	R²	für Wasserstoff oder C ₁₋₈ -Alkyl steht oder mit
		R _a -R _f von Z oder zu R ₁ eine Brücke mit bis zu
		3 Ringgliedem bildet,
5	R³	für unsubstituiertes oder gegebenenfalls ein-
		oder mehrfach mit Halogen C ₁₋₈ -Alkyl, C ₁₋₈ -
		Alkoxy oder Hydroxy, substituiertes
		monozyklisches oder bizyklisches Aryl oder
		monozyklisches oder bizyklisches Heteroaryl
10		steht,
	R⁴, R⁵, R⁵ und R ⁷	unabhängig voneinander für Wasserstoff,
		Halogen oder unsubstituiertes oder
		gegebenenfalls ein- oder mehrfach mit
		Halogen substituiertes C ₁₋₆ -Alkoxy oder C ₁₋₆ -
15		Alkyl stehen,
		oder R⁵ und R⁵ gemeinsam die Gruppe
		CH ₂
		O
		hildon
20	R ⁸ , R ⁹ und R ¹⁰	bilden,
	it, it und it	unabhängig voneinander für Wasserstoff oder
		C _{1-e} -Alkyl stehen,

25 Auch besonders bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen Formel I

bedeuten, sowie deren Isomeren und Salze.

$$R^{5}$$
 R^{6}
 R^{7}
 R^{3}

in der

Α

w

Z


für die Gruppe =NR2 steht,

für Sauerstoff, Schwefel oder zwei

Wasserstoffatome steht,

für die Gruppe =NR¹⁰, =N-, -N(R¹⁰)-(CH₂)_q-

oder die Gruppe




10


5

steht, oder A, Z und R¹ gemeinsam die Gruppe

bilden,

für 0 - 3 stehen, m, n und o q· für 1 - 6 steht, R_a , R_b , R_c , R_d , R_e , R_f unabhängig voneinander für Wasserstoff oder Methyl oder die Gruppe =NR¹⁰ stehen, 5 für die Gruppe =NR⁹ oder =N- steht, für die Gruppe -CH2- steht, R^1 für Phenyl, Pyridyl, 5-Chlor-2,3-Dihydroindenyl, 2,3-Dihydroindenyl, Thienyl, 10 6-Fluor-1H-indol-3-yl, Naphthyl, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthyl, Benzo-1,2,5-oxadiazol, 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphtyl, oder für ein- oder mehrfach mit C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Hydroxy, Halogen, 15 Trifluormethyl substituiertes Phenyl oder Pyridyl oder für die Gruppe





steht, wobei Phenyl, oder substituiertes
Phenyl oder Naphthyl nicht unmittelbar an der
=NR² Gruppe in der Bedeutung von A stehen,
für Wasserstoff oder Methyl steht,
für Pyridyl oder mit Hydroxy, Halogen, Methyl
oder Methoxy substituiertes Phenyl, Pyridyl
oder 1,2,3,4-Tetrahydronaphthyl oder die
Gruppe

Z,	NOME	ÇH3 O
X, Ci	N OH	Jach,
ZH ZH		

5

 R^2

 R^3

steht,

10

R⁵ und R⁵ unabhängig voneinander für Wasserstoff,

Halogen, Methyl, Methoxy oder Trifluormethyl

stehen,

R⁴ und R⁷

unabhängig voneinander für Wasserstoff oder

Halogen stehen,

R⁹

für Wasserstoff steht,

 R^{10}

für Wasserstoff oder Methyl steht, bedeuten,

sowie deren Isomeren und Salze.

10

5

Als ganz besonders wirksam haben sich solche Verbindungen der allgemeinen Formel I erwiesen, in der

Α .

für die Gruppe =NR² steht,


W

für Sauerstoff steht,

15 Z

für die Gruppe =NR¹⁰, =N-,

-N(R^{10})-(CH_2)_q- oder die Gruppe



steht, oder A, Z und R¹ gemeinsam die Gruppe

bilden,

m, n und o

für 0 - 3 stehen,

q

für 1 – 6 steht,

5 R_a , R_b , R_c , R_d , R_e , R_f

unabhängig voneinander für Wasserstoff oder

Methyl oder die Gruppe =NR10 stehen,

X

für die Gruppe =NR⁹ oder =N- steht,

Y

für die Gruppe -CH₂- steht,

 R^1

für Phenyl, Pyridyl, 5-Chlor-2,3-

10

Dihydroindenyl, 2,3-Dihydroindenyl, Thienyl,

6-Fluor-1H-indol-3-yl, Naphthyl, 1,2,3,4-

Tetrahydronaphthyl, Benzo-1,2,5-oxadiazol

oder 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-

naphtyl oder für ein- oder mehrfach mit C_1 - C_4 -

Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Hydroxy, Halogen,

Trifluormethyl, substituiertes Phenyl oder

Pyridyl oder für die Gruppe

15

-SI)a	SIL	
~°S CO		- S
		-STOCE,
		ДСН,
H,C	$\overline{}$	
	H ₃ C	H,C CL OCH,

R²

 R^3

10

steht, wobei Phenyl, oder substituiertes
Phenyl oder Naphthyl nicht unmittelbar an der
=NR² Gruppe in der Bedeutung von A stehen,
für Wasserstoff oder Methyl steht,
für Pyridyl oder für ein- oder mehrfach mit
Hydroxy, Halogen, Methyl oder Methoxy
substituiertes Phenyl, Pyridyl oder 1,2,3,4Tetrahydronaphthyl oder für die Gruppe

I N	N. OMe	
	N OME	CH ₃
NNO CH3	N CI	NOH
N CI	N OMe	NOH
N_CH ₃	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	

steht,

R⁵ und R⁶

unabhängig voneinander für Wasserstoff,

5

15

Halogen, Methyl, Methoxy oder Trifluormethyl

stehen,

R⁴ und R⁷

unabhängig voneinander für Wasserstoff und

Halogen stehen,

.Rº

für Wasserstoff steht,

10 R¹⁰

für Wasserstoff oder Methyl steht, bedeuten,

sowie deren Isomeren und Salze.

Ebenfalls als ganz besonders wirksam haben sich solche Verbindungen der allgemeinen Formel I erwiesen, in der

Α

für die Gruppe =NR² steht,


W

für Schwefel steht.

Z

für die Gruppe =NR¹⁰, =N-,

-N(R^{10})-(CH_2)_q- oder die Gruppe



steht, oder A, Z und R¹ gemeinsam die Gruppe

5

bilden,

m, n und o für 0 – 3 stehen, q für 1 – 6 steht, R_a , R_b , R_c , R_d , R_e , R_r unabhängig vone

unabhängig voneinander für Wasserstoff oder Methyl oder die Gruppe =NR¹º stehen, für die Gruppe =NR³ oder =N- steht, für die Gruppe -CH₂- steht,

für Phenyl, Pyridyl, 5-Chlor-2,3Dihydroindenyl, 2,3-Dihydroindenyl, Thienyl,
6-Fluor-1H-indol-3-yl, Naphthyl, 1,2,3,4-

Tetrahydronaphthyl, Benzo-1,2,5-oxadiazol oder 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphtyl oder für ein- oder mehrfach mit C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Hydroxy, Halogen, Trifluormethyl, substituiertes Phenyl oder

15

10

X Y

 R^1

Pyridyl oder für die Gruppe

	NS NS	
N CI		
S CF ₃		-
-\sum_a	-SII_F	
~;\(\)		- S
		→ S OCF,
		Сн,
H,C	- ○ - ○	

 R^2

 \mathbb{R}^3

10

steht, wobei Phenyl, oder substituiertes
Phenyl oder Naphthyl nicht unmittelbar an der
=NR² Gruppe in der Bedeutung von A stehen,
für Wasserstoff oder Methyl steht,
für Pyridyl oder für ein- oder mehrfach mit
Hydroxy, Halogen, Methyl oder Methoxy
substituiertes Phenyl, Pyridyl oder 1,2,3,4Tetrahydronaphthyl oder für die Gruppe

steht,

R⁵ und R6	unabhängig voneinander für Wasserstoff,
-----------	---

Halogen, Methyl, Methoxy oder Trifluormethyl

stehen,

5 R⁴ und R⁷ unabhängig voneinander für Wasserstoff und

Halogen stehen,

R⁹ für Wasserstoff steht,

R¹⁰ für Wasserstoff oder Methyl steht, bedeuten,

sowie deren Isomeren und Salze.

10


Ebenfalls als ganz besonders wirksam haben sich solche Verbindungen der allgemeinen Formel I erwiesen, in der

A für die Gruppe =NR² steht,

W für zwei Wasserstoffatome steht,

15 Z für die Gruppe = NR^{10} , =N-,

-N(R^{10})-(CH_2) $_q$ - oder die Gruppe



steht, oder A, Z und R¹ gemeinsam die Gruppe

bilden,

m, n und o

für 0 – 3 stehen,

q

für 1 – 6 steht,

5 R_a , R_b , R_c , R_d , R_e , R_f

unabhängig voneinander für Wasserstoff oder

Methyl oder die Gruppe =NR¹⁰ stehen,

X

für die Gruppe =NRº oder =N- steht,

Υ

für die Gruppe -CH2- steht,

R1

für Phenyl, Pyridyl, 5-Chlor-2,3-

Dihydroindenyl, 2,3-Dihydroindenyl, Thienyl,

6-Fluor-1H-indol-3-yl, Naphthyl, 1,2,3,4-

Tetrahydronaphthyl, Benzo-1,2,5-oxadiazol

oder 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-

naphtyl oder für ein- oder mehrfach mit C_1 - C_4 -

Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Hydroxy, Halogen,

Trifluormethyl, substituiertes Phenyl oder

Pyridyl oder für die Gruppe

	T,s	(T)
N CO		
S CF ₃		

10

15


	T	
- SII a	S	
		~ S
		STOCF,
\$II		тусн,
H,C		
CX->	H ₃ C	H ₃ C CH ₃

R²

 R^3

10

steht, wobei Phenyl, oder substituiertes
Phenyl oder Naphthyl nicht unmittelbar an der
=NR² Gruppe in der Bedeutung von A stehen,
für Wasserstoff oder Methyl steht,
für Pyridyl oder für ein- oder mehrfach mit
Hydroxy, Halogen, Methyl oder Methoxy
substituiertes Phenyl, Pyridyl oder 1,2,3,4Tetrahydronaphthyl oder für die Gruppe



steht,

5 R⁴ und R⁷

unabhängig voneinander für Wasserstoff,

Halogen, Methyl, Methoxy oder Trifluormethyl

stehen,

R⁵und R⁶

unabhängig voneinander für Wasserstoff und

Halogen stehen,

10 R⁹

für Wasserstoff steht,

 R^{10}

für Wasserstoff oder Methyl steht, bedeuten,

sowie deren Isomeren und Salze.

- Die erfindungsgemäßen Verbindungen verhindern eine Phosphorylierung, d. h. bestimmte Tyrosinkinasen können selektiv inhibiert werden, wobei die persistente Angiogenese gestoppt werden kann. Somit wird beispielsweise das Wachstum und die Ausbreitung von Tumoren unterbunden.
- Die erfindungsgemäßen Verbindungen der allgemeinen Formel I beinhalten auch die möglichen tautomeren Formen und umfassen die E- oder Z-Isomeren oder, falls ein chirales Zentrum vorhanden ist, auch die Racemate und Enantiomeren.

WO 00/27819

Die Verbindungen der Formel I sowie deren physiologisch verträglichen Salze sind auf Grund ihrer inhibitorischen Aktivität in Bezug auf Phosphorylierung des VEGF-Rezeptors als Arzneimittel verwendbar. Auf Grund ihres Wirkprofils eignen sich die erfindungsgemäßen Verbindungen zur Behandlung von Erkrankungen, die durch eine persistente Angiogenese hervorgerufen werden.

Da die Verbindungen der Formel I als Inhibitoren der Tyrosinkinase KDR und FLT identifiziert werden, eignen sie sich insbesondere zur Behandlung von solchen Krankheiten, die durch die über den VEGF-Rezeptor ausgelöste persistente Angiogenese oder eine Erhöhung der Gefäßpermeabilität hervorgerufen werden.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist auch die Verwendung der erfindungsgemäßen Verbindungen als Inhibitoren der Tyrosinkinase KDR und FLT.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind somit auch Arzneimittel zur Behandlung von Tumoren.

20

25

15

10

Die erfindungsgemäßen Verbindungen können entweder alleine oder in Formulierung als Arzneimittel zur Behandlung von Psoriasis, Arthritis, wie rheumatoide Arthritis, Hämangioma, Angiofribroma, Augenerkrankungen, wie diabetische Retinopathie, Neovaskulares Glaukom, Nierenerkrankungen, wie Glomerulonephritis, diabetische Nephropatie, maligne Nephrosklerose, thrombische mikroangiopatische Syndrome, Transplantationsabstoßungen und Glomerulopathie, fibrotische Erkrankungen, wie Leberzirrhose, mesangialzellproliferative Erkrankungen, Artheriosklerose und Verletzungen des Nervengewebes zum Einsatz kommen.

30

Die erfindungsgemäßen Verbindungen können ebenfalls zum Einsatz kommen bei der Hemmung der Reocclusion von Gefäßen nach Ballonkathetherbehandlung, bei der Gefäßprothetik oder nach dem Einsetzen von mechanischen Vorrichtungen zum Offenhalten von Gefäßen wie z. B. Stents.

Bei der Behandlung von Verletzungen des Nervengewebes kann mit den erfindungsgemäßen Verbindungen eine schnelle Narbenbildung an den Verletzungsstellen verhindert werden, d. h. es wird verhindert, daß die Narbenbildung eintritt, bevor die Axone wieder Verbindung miteinander aufnehmen. Damit würde eine Rekonstruktion der Nervenverbindungen erleichtert.

Ferner kann mit den erfindungsgemäßen Verbindungen die Ascites-Bildung bei Patienten unterdrückt werden. Ebenso lassen sich VEGF bedingte Ödeme unterdrücken.

15

Derartige Arzneimittel, deren Formulierungen und Verwendungen sind ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung.

Die Erfindung betrifft ferner die Verwendung der Verbindungen der allgemeinen
Formel I, zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Tumoren,
Psoriasis, Arthritis, wie rheumatoide Arthritis, Hämangioma, Angiofribroma,
Augenerkrankungen, wie diabetische Retinopathie, Neovaskulares Glaukom,

Nierenerkrankungen, wie Glomerulonephritis, diabetische Nephropatie, maligne
Nephrosklerose, thrombische mikroangiopatische Syndrome, Transplantationsabstoßungen und Glomerulopathie, fibrotische Erkrankungen, wie
Leberzirrhose, mesangialzellproliferative Erkrankungen, Artheriosklerose,
Verletzungen des Nervengewebes, Hemmung der Reocclusion von Gefäßen
nach Ballonkathetherbehandlung, bei der Gefäßprothetik oder nach dem
Einsetzen von mechanischen Vorrichtungen zum Offenhalten von Gefäßen wie
z. B. Stents.

25

Zur Verwendung der Verbindungen der Formel I als Arzneimittel werden diese in die Form eines pharmazeutischen Präparats gebracht, das neben dem Wirkstoff für die enterale oder parenterale Applikation geeignete

- pharmazeutische, organische oder anorganische inerte Trägermaterialien, wie zum Beispiel, Wasser, Gelatine, Gummi arabicum, Milchzucker, Stärke, Magnesiumstearat, Talk, pflanzliche Öle, Polyalkylenglykole usw. enthält. Die pharmazeutischen Präparate können in fester Form, zum Beispiel als Tabletten, Dragees, Suppositorien, Kapseln oder in flüssiger Form, zum Beispiel als
- Lösungen, Suspensionen oder Emulsionen vorliegen. Gegebenenfalls enthalten sie darüber hinaus Hilfsstoffe wie Konservierungs-, Stabilisierungs-, Netzmittel oder Emulgatoren, Salze zur Veränderung des osmotischen Drucks oder Puffer.

Für die parenterale Anwendung sind insbesondere Injektionslösungen oder
Suspensionen, insbesondere wäßrige Lösungen der aktiven Verbindungen in polyhydroxyethoxyliertem Rizinusöl, geeignet.

Als Trägersysteme können auch grenzflächenaktive Hilfsstoffe wie Salze der Gallensäuren oder tierische oder pflanzliche Phospholipide, aber auch Mischungen davon sowie Liposome oder deren Bestandteile verwendet werden.

Für die orale Anwendung sind insbesondere Tabletten, Dragees oder Kapseln mit Talkum und/oder Kohlenwasserstoffträger oder -binder, wie zum Beispiel

Lactose, Mais- oder Kartoffelstärke, geeignet. Die Anwendung kann auch in flüssiger Form erfolgen, wie zum Beispiel als Saft, dem gegebenenfalls ein Süßstoff beigefügt ist.

Die Dosierung der Wirkstoffe kann je nach Verabfolgungsweg, Alter und Gewicht des Patienten, Art und Schwere der zu behandelnden Erkrankung und

ähnlichen Faktoren variieren. Die tägliche Dosis beträgt 0,5-1000 mg, vorzugsweise 50-200 mg, wobei die Dosis als einmal zu verabreichende Einzeldosis oder unterteilt in 2 oder mehreren Tagesdosen gegeben werden kann.

Die oben beschrieben Formulierungen und Darreichungsformen sind ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung.

- Die Herstellung der erfindungsgemäßen Verbindungen erfolgt nach an sich bekannten Methoden. Beispielsweise gelangt man zu Verbindungen der Formel I dadurch, daß man
 - a) eine Verbindung der Formel II

15

20

5

$$R^{5}$$
 R^{4}
 R^{5}
 R^{6}
 R^{7}
 R^{7}
 R^{6}
 R^{7}
 R^{7

worin R^4 bis R^7 die obige Bedeutung haben und T H oder eine Schutzgruppe und A Halogen oder OR^{13} ist, wobei R^{13} ein Wasserstoffatom, C_{14} -Alkyl oder C_{14} -Acyl bedeutet oder einen Ring mit T schliesst, zunächst N alkyliert und dann COA in ein Amid überführt und dann gegebenenfalls Schutzgruppen abspaltet oder zunächst in daß Amid überführt und anschließend N-alkyliert oder

b) eine Verbindung der Formel III worin R⁴ bis R⁷ die obige Bedeutung haben und T H oder eine Schutzgruppe bedeuten orthometalliert und dann durch Abfang mit einem Elektrophil in ein Amid überführt, dann die Schutzgruppe abspaltet und die Aminogruppe alkyliert,

oder

5

c) eine Verbindung der Formel IV worin R⁴ bis R⁷ die obige Bedeutung haben und T H oder eine Schutzgruppe und B Halogen oder O-Triflat, O-Tosylat oder O-Mesylat bedeuten in ein Amid überführt, dann die Schutzgruppe abspaltet und die Aminogruppe alkyliert

10

15

Die Reihenfolge der Schritte kann in allen drei Fällen vertauscht werden.

Die Amidbildung erfolgt nach literaturbekannten Methoden.

Zur Amidbildung kann man von einem entsprechenden Ester ausgehen. Der Ester wird nach J. Org. Chem. 1995, 8414 mit Aluminiumtrimethyl und dem entsprechenden Amin in Lösungsmitteln wie Toluol bei Temperaturen von 0°C bis zum Siedepunkt des Lösungsmittels umgesetzt. Diese Methode ist auch bei ungeschützten Anthranilsäureestern anwendbar. Enthält das Molekül zwei Estergruppen, werden beide in das gleiche Amid überführt.

20

Beim Einsatz von Nitrilen statt des Esters erhält man unter analogen Bedingungen Amidine.

Zur Amidbildung stehen aber auch alle aus der Peptidchemie bekannten
 Verfahren zur Verfügung. Beispielsweise kann die entsprechende Säure in aprotischen polaren Lösungsmitteln wie zum Beispiel Dimethylformamid über eine aktiviertes Säurederivat, zum Beispiel erhältlich mit Hydroxybenzotriazol und einem Carbodiimid wie zum Beispiel Diisopropylcarbodiimid oder auch mit vorgebildeten Reagenzien wie zum Beispiel HATU (Chem. Comm. 1994, 201)
 oder BTU, bei Temperaturen zwischen 0°C und dem Siedepunkt des Lösungsmittels vorzugsweise bei 80°C mit dem Amin bei HATU vorzugsweise

bei Raumtemperatur umgesetzt werden. Diese Methoden sind auch bei den

ungeschützten Anthranilsäuren zu benutzen. Für die Amidbildung kann auch das Verfahren über das gemischte Säureanhydrid, Imidazolid oder Azid eingesetzt werden. Ein vorheriger Schutz der Aminogruppe beispielsweise als Amid ist nicht in allen Fällen erforderlich, kann die Reaktion aber günstig beeinflussen. Ein besonderes Ausgangsmaterial sind Isatosäureanhydride, bei denen der Schutz der Aminogruppe und die Aktivierung der Säurefunktion gleichzeitig vorliegen.

- Wenn man das Amin vorher in die BOC-geschützte Verbindung überführt, lässt 10 sich die ortho-Stellung durch Umsetzung mit metallorganischen Verbindungen wie beispielsweise n-Butyllithium metallieren und anschliessend mit Isocyanaten oder Isothiocyanaten zu den Anthranilamiden bzw. Anthranilthioamiden abfangen. Ein Brom- oder Jodsubstituent in dieser ortho-Stellung erleichtern durch Halogen-Metall-Austausch die ortho-Metallierung. Als 15 Lösungsmittel eignen sich Ether wie Diethylether oder Tetrahydrofuran oder Kohlenwasserstoffe wie Hexan aber auch Mischungen daraus. Die Zugabe von Komplexbildnern wie Tetramethylethylendiamin (TMEDA) ist vorteilhaft. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -78°C und Raumtemperatur. Die Spaltung der BOC-Amide erfolgt durch Behandlung mit Säuren wie 20 Trifluoressigsäure ohne Lösungsmittel oder in Lösungsmitteln wie Methylenchlorid bei Temperaturen von 0°C bis zum Siedepunkt des Lösungsmittels oder mit wässriger Salzsäure vorzugsweise 1N-Salzsäure in Lösungsmitteln wie Ethanol oder Dioxan bei Temperaturen von Raumtemperatur bis zum Siedepunkt des Lösungsmittels. 25
 - Die Amidgruppe kann aber auch durch Carbonylierung eingeführt werden. Dazu geht man von den entsprechenden Verbindungen der Formel IV (o-Jod-, o-Brom- oder o-Triflyloxyanilinen) aus, die mit Kohlenmonoxid bei Normal- oder auch erhöhtem Druck und einem Amin in Gegenwart von Übergangsmetallkatalysatoren wie zum Beispiel Palladium(II)chlorid oder Palladium(II) acetat oder auch Palladiumtetrakistriphenylphosphin in

Lösungsmitteln wie Dimethylformamid umgesetzt werden. Die Zugabe eines Liganden wie Triphenylphosphin und die Zugabe einer Base wie Tributylamin kann vorteilhaft sein. (s. beispielsweise J.Org.Chem. 1974, 3327; J.Org.Chem. 1996, 7482; Synth. Comm. 1997, 367; Tetr.Lett 1998, 2835)

Sollen verschiedene Amidgruppen in das Molekül eingeführt werden, muss beispielsweise die zweite Estergruppe nach der Erzeugung der ersten Amidgruppe in das Molekül eingeführt und dann amidiert werden oder man hat ein Molekül in dem eine Gruppe als Ester, die andere als Säure vorliegt und amidiert die beiden Gruppen nacheinander nach verschiedenen Methoden.

10

20

25

30

Thioamide sind aus den Anthranilamiden durch Umsetzung mit Diphosphadithianen nach Bull Soc.Chim.Belg. 87, 229,1978 oder durch Umsetzung mit Phosphorpentasulfid in Lösungsmitteln wie Pyridin oder auch ohne Lösungsmittel bei Temperaturen von 0°C bis 200°C zu erhalten.

Die Produkte können als elektronenreiche Aromaten auch elektrophilen aromatischen Substitutionen unterworfen werden. Die Substitution erfolgt dann in der ortho- oder para-Position zu der oder einer der Aminogruppe(n). So kann durch Friedel-Crafts-Acylierung mit Säurechloriden in Gegenwart von Friedel-Crafts Katalysatoren wie zum Beispiel Aluminiumtrichlorid in Lösungsmitteln wie Nitromethan, Schwefelkohlenstoff, Methylenchlorid oder Nitrobenzol bei Temperaturen zwischen 0°C und dem Siedepunkt des Lösungsmittels vorzugsweise bei Raumtemperatur acyliert werden.

Es kann nach literaturbekannten Verfahren beispielsweise durch Nitriersäure, verschieden konzentrierte Salpetersäure ohne Lösungsmittel oder durch Metallnitrate wie beispielsweise Kupfer(II)nitrat oder Eisen(III)nitrat in polaren Lösungsmitteln wie Ethanol oder Eisessig oder auch in Acetanhydrid eine oder mehrere Nitrogruppen eingeführt werden.

Die Einführung von Halogenen erfolgt nach literaturbekannten Verfahren z.B. durch Umsetzung mit Brom, N-Brom- oder N-Jodsuccinimid oder Urotropinhydrotribromid in polaren Lösungsmitteln wie Tetrahydrofuran,

5 Acetonitril, Methylenchlorid, Eisessig oder Dimethylformamid.

Die Reduktion der Nitrogruppe wird in polaren Lösungsmitteln bei Raumtemperatur oder erhöhter Temperatur durchgeführt. Als Katalysatoren für die Reduktion sind Metalle wie Raney-Nickel oder Edelmetallkatalysatoren wie Palladium oder Platin oder auch Palladiumhydroxid gegebenenfalls auf Trägern geeignet. Statt Wasserstoff können auch zum Beispiel Ammoniumformiat, Cyclohexen oder Hydrazin in bekannter Weise benutzt werden. Reduktionsmittel wie Zinn-II-chlorid oder Titan-(III)-chlorid können ebenso verwendet werden wie komplexe Metallhydride eventuell in Gegenwart von Schwermetallsalzen. Als Reduktionsmittel ist auch Eisen nutzbar. Die Reaktion wird dann in Gegenwart einer Säure wie z.B. Essigsäure oder Ammoniumchlorid gegebenenfalls unter Zusatz eines Lösungsmittels wie zum Beispiel Wasser, Methanol etc. durchgeführt. Bei verlängerter Reaktionszeit kann bei dieser Variante eine Acylierung der Aminogruppe eintreten.

Wird eine Alkylierung einer Aminogruppe gewünscht, so kann nach üblichen Methoden - beispielsweise mit Alkylhalogeniden - oder nach der Mitsunobu Variante durch Umsetzung mit einem Alkohol in Gegenwart von beispielsweise Triphenylphosphin und Azodicarbonsäureester alkyliert werden. Man kann auch das Amin einer reduktiven Alkylierung mit Aldehyden oder Ketonen unterwerfen, wobei man in Gegenwart eines Reduktionsmittels wie beispielsweise Natriumcyanoborhydrid in einem geeigneten inerten Lösungsmittel wie zum Beispiel Ethanol bei Temperaturen von 0°C bis zum Siedepunkt des Lösungsmittels umsetzt. Wenn man von einer primären
Aminogruppe ausgeht, so kann man gegebenenfalls nacheinander mit zwei verschiedenen Carbonylverbindungen umsetzen, wobei man gemischte Derivate erhält [Literatur z.B. Verardo et al. Synthesis (1993), 121; Synthesis

(1991), 447; Kawaguchi, Synthesis (1985), 701; Micovic et al. Synthesis (1991), 1043].

- Es kann vorteilhaft sein, zunächst die Schiffsche Base durch Umsetzung des Aldehyds mit dem Amin in Lösungsmitteln wie Ethanol oder Methanol, gegebenenfalls unter Zugabe von Hilfsstoffen wie Eisessig zu bilden und dann erst Reduktionsmittel wie z. B. Natriumcyanoborhydrid zuzusetzen.
- Die Hydrierung von Alken-oder Alkingruppen im Molekül erfolgt in üblicher Weise beispielsweise durch katalytisch erregten Wasserstoff. Als Katalysatoren können Schwermetalle wie Palladium oder Platin, gegebenenfalls auf einem Träger oder Raney-Nickel benutzt werden. Als Lösungsmittel kommen Alkohole wie z.B. Ethanol in Frage. Es wird bei Temperaturen von 0° C bis zum
 Siedepunkt des Lösungsmittels und bei Drücken bis zu 20 Bar, vorzugsweise aber bei Raumtemperatur und Normaldruck gearbeitet. Durch die Verwendung von Katalysatoren, wie beispielsweise eines Lindlar-Katalysators lassen sich Dreifachbindungen zu Doppelbindungen partiell hydrieren, wobei vorzugsweise die Z-Form entsteht.

20

25

30

Die Acylierung einer Aminogruppe erfolgt in üblicher Weise beispielsweise mit einem Säurehalogenid oder Säureanhydrid gegebenenfalls in Gegenwart einer Base wie Dimethylaminopyridin in Lösungsmitteln wie Methylenchlorid, Tetrahydrofuran oder Pyridin, nach der Schotten-Baumann-Variante in wäßriger Lösung bei schwach alkalischem pH-Wert oder durch Umsetzung mit einem Anhydrid in Eisessig.

Die Einführung der Halogene Chlor, Brom, Jod oder der Azidogruppe über eine Aminogruppe kann beispielsweise auch nach Sandmeyer erfolgen, indem man die mit Nitriten intermediär gebildeten Diazoniumsalze mit Kupfer(I)chlorid oder Kupfer(I)bromid in Gegenwart der entsprechenden Säure wie Salzsäure oder Bromwasserstoffsäure oder mit Kaliumjodid umsetzt.

Wenn ein organischer Salpetrigsäureester benutzt wird, kann man die Halogene z.B. durch Zusatz von Methylenjodid oder Tetrabrommethan einführen in einem Lösungsmittel wie zum Beispiel Dimethylformamid. Die Entfernung der Aminogruppe kann entweder durch Umsetzung mit einem organischen Salpetrigsäureester in Tetrahydrofuran oder durch Diazotierung und reduktive Verkochung des Diazoniumsalzes beispielsweise mit phosphoriger Säure gegebenenfalls unter Zugabe von Kupfer (I) oxid bewerkstelligt werden.

10

30

Die Einführung von Fluor gelingt beispielsweise durch Balz-Schiemann-Reaktion des Diazoniumtetrafluorborates oder nach J. Fluor. Chem. **76**,1996,59-62 durch Diazotierung i.G. von HFxPyridin und anschliessende Verkochung gegebenenfalls i.G. einer Fluoridionenquelle wie z.B.

5 Tetrabutylammoniumfluorid.

Die Einführung der Azidogruppe gelingt nach Diazotierung durch Umsetzung mit Natriumazid bei Raumtemperatur.

Etherspaltungen werden nach literaturüblichen Verfahren durchgeführt. Dabei kann auch bei mehreren im Molekül vorhandenen Gruppen eine selektive Spaltung erreicht werden. Dabei wird der Ether beispielsweise mit Bortribromid in Lösungsmitteln wie Dichlormethan bei Temperaturen zwischen –100 °C bis zum Siedepunkt des Lösungsmittels vorzugsweise bei –78 °C behandelt. Es ist aber auch möglich, den Ether durch Natriumthiomethylat in Lösungsmitteln wie Dimethylformamid zu spalten. Die Temperatur kann zwischen Raumtemperatur und dem Siedepunkt des Lösungsmittels vorzugsweise bei 150°C liegen.

Die N- oder O-Alkylierung von Amiden wie dem Pyrid-2-on bzw 2-Hydroxypyridin gelingt nach literaturbekannten Methoden. So erreicht man mit Basen wie Natriumhydrid oder Kaliumcarbonat in Lösungsmitteln wie Dimethylformamid und Alkylierung mit Alkylhalogeniden wie Methyljodid eine N-

10

15

20

Alkylierung. Mit Basen wie Silberkarbonat iin Lösungsmitteln wie Tetrahydrofuran oder Toluol oder Vorzugsweise Mischungen davon mit Alkylhalogeniden wie Methyljodid eine O-Alkylierung. Eine O-Alkylierung erhält man auch beim Umsatz mit Trialkyloxoniumtetrafluoroborat in inerten Lösungsmitteln wie Methylenchlorid. Die Umsetzung mit Diazomethan oder Trimethylsilyldiazomethan in Lösungsmitteln wie Methanol oder Toluol vorzugsweise in Mischungen davon bei Temperaturen bis zum Siedepunkt der Lösungsmittel vorzugsweise aber bei Raumtemperatur erhält man Gemische aus N-und O-Alkylderivaten. Die Methoden ermöglichen eine selektive Alkylierung des Pyridons gegenüber dem Benzoesäureamid.

Die Isomerengemische können nach üblichen Methoden wie beispielsweise Kristallisation, Chromatographie oder Salzbildung in die Enantiomeren bzw. E/Z-Isomeren aufgetrennt werden.

Die Herstellung der Salze erfolgt in üblicher Weise, indem man eine Lösung der Verbindung der Formel I mit der äquivalenten Menge oder einem Überschuß einer Base oder Säure, die gegebenenfalls in Lösung ist, versetzt und den Niederschlag abtrennt oder in üblicher Weise die Lösung aufarbeitet.

Soweit die Herstellung der Ausgangsverbindungen nicht beschrieben wird, sind diese bekannt oder analog zu bekannten Verbindungen oder hier beschriebenen Verfahren herstellbar.

25

Ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind die Isatosäure-Derivate der allgemeinen Formel V

$$R^{5}$$
 R^{6}
 R^{7}
 R^{3}

5 V

in der R³-R², X, Y und W die in der allgemeinen Formel I beschriebenen Bedeutungen haben und in der A für die Gruppe =NR² oder Sauerstoff steht und Z und R¹ gemeinsam eine an X gebundene =C=O Gruppe bilden, sowie deren Isomeren und Salze, als wertvolle Zwischenprodukte zur Herstellung der erfindungsgemäßen Verbindungen der allgemeinen Formel I.

Besonders wertvoll sind solche Zwischenprodukte der allgemeinen Formel V, in der

	A und W	für Sauerstoff stehen,
15	Z und R¹	gemeinsam eine an X gebundene =C=O Gruppe
		bilden,
	X	für die Gruppe =NR9 oder =N- steht,
	Υ	für die Gruppe -CH₂- steht,
	R³	für Pyridyl oder durch Hydroxy, Brom, Methyl oder
20		Methoxy substituiertes Phenyl oder 1,2,3,4-
		Tetrahydronaphthyl steht,
	R⁵ und R⁵	für Wasserstoff, Chlor, Methyl, Methoxy oder
		Trifluormethyl stehen,
	R ⁴ und R ⁷	für Wasserstoff stehen,

für Wasserstoff steht,

bedeuten, sowie deren Isomeren und Salze.

Die Zwischenprodukte sind teilweise selbst aktiv und können somit ebenfalls zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Tumoren, Psoriasis, Arthritis, wie rheumatoide Arthritis, Hämangioma, Angiofribroma,

- Augenerkrankungen, wie diabetische Retinopathie, Neovaskulares Glaukom, Nierenerkrankungen, wie Glomerulonephritis, diabetische Nephropatie, maligne Nephrosklerose, thrombische mikroangiopatische Syndrome, Transplantationsabstoßungen und Glomerulopathie, fibrotische Erkrankungen, wie Leberzirrhose, mesangialzellproliferative Erkrankungen, Artheriosklerose,
- Verletzungen des Nervengewebes, Hemmung der Reocclusion von Gefäßen nach Ballonkatheterbehandlung, bei der Gefäßprothetik oder nach dem Einsetzen von mechanischen Vorrichtungen zum Offenhalten von Gefäßen, wie z. B. Stents., zum Einsatz kommen.

Die nachfolgenden Beispiele erläutern die Herstellung der erfindungsgemäßen Verbindungen, ohne den Umfang der beanspruchten Verbindungen auf diese Beispiele zu beschränken.

5

10

15

20

Beispiel 1.0

Herstellung von N - (4 - Pyridylmethyl) - anthranilsäuremethylester

Unter Stickstoffatmosphäre wird ein Gemisch von 7,5 g Anthranilsäuremethylester und 8,6 g Pyridin- 4 – carbaldehyd in 300 ml Methanol mit 3 ml Essigsäure versetzt und 12 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird das Reaktionsgemisch mit 5,7 g Natriumcyanoborhydrid (85 %ig) versetzt und weitere 3 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Nach dieser Zeit werden nochmals 1,14 g Natriumcyanoborhydrid (85 %ig) nachgegeben und weitere 12 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Das Reaktionsgemisch wird eingeengt. Der Rückstand wird in Essigester aufgenommen und mit gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung und gesättigter Natriumchloridlösung gewaschen. Die getrocknete organische Phase wird eingedampft und der Rückstand mittels Säulenchromatographie an Kieselgel, unter Verwendung von Hexan/ Essigester (1+1), gereinigt.

Man erhält 10,2 g der Titelverbindung vom Schmelzpunkt 85,6 °C

Beispiel 2.0

Herstellung von N -(3 - Phenylprop -1- yl) –N2- (4 - pyridylmethyl) - anthranilsäureamid

5

10

242 mg N – (4 – Pyridylmethyl) - anthranilsäuremethylester werden in 3,5 ml Toluol vorgelegt, mit 202 mg 3-Phenylpropylamin versetzt und bei 0°C zügig mit 0,75 ml einer 2 molaren Lösung von Trimethylaluminium in Toluol versetzt. Das Reaktionsgemisch wird dann 1 Stunde bei Raumtemperatur und anschließend 1 Stunde am Rückfluß erhitzt. Nach Abkühlen wird das Reaktionsgemisch auf gesättigte Natriumhydrogencarbonatlösung gegeben und mit Essigester extrahiert. Die organische Phase wird gewaschen, getrocknet, filtriert und im Vakuum eingeengt. Der Rückstand wird anschließend aus Essigester umkristallisiert.

15

Man erhält 265 mg der Titelverbindung vom Schmelzpunkt 117,4 °C.

In analoger Verfahrensweise zu Beispiel 2.0 werden auch folgende Verbindungen hergestellt:

$$\begin{array}{c}
O \\
N \\
R^{2} \\
N \\
R^{3}
\end{array}$$

$$R^{2}$$
, $R^{9} = H$ $R^{3} = -CH_{2}$

Beispiel	R¹	Schmelzpunkt °C
2.1	—CH ₂ —CI	133,4
2.2		152,8
2.3	—(CH ₂) ₂ —CI	107,7
2.4	-NH-CI	ÖI
2.5	—N(CH ₃)-	123-124
2.6	-CH ₂	88,1
2.7	$C(CH_3)_{\overline{2}}-CH_{\overline{2}}-$	114,5
2.8	F (CH ₂) ₂	170,5
2.9	OMe	65,5
2.10	-CH ₂	ÖI

Beispiel	. R¹	Schmelzpunkt °C
2.11	CH ₂	119
2.12	CH(CH ₃)	156,2
2.13		121,7
2.14	—(CH ₂) ₃ —CI	ÖI
2.15	—CH(CH ₃)—CI	166,4
2.16	—СН ₂ -СН(СН ₃)СІ	ÖI
2.17	—сн(сн ₃)-сн ₂ —сі	132,9
2.18	—CH ₂ -CH(CH ₃)—	Öl
2.19	C(CH ₃) ₂	133,8
2.20	Ç CI	Öl
2.21	OMe OMe	Öl
2.22		Öl
2.23	T,s	Öl

Painnial	. R ¹	Schmelzpunkt
Beispiel		°C ○I
2.24		OI ·
2.25		Öl
2.26		129,7
2.27		182,4
2.28	N	105-106
2.29		94-95
2.30		ÖI
2.31		152,3
2.32	N CI	173-175
2.33	Br N	190-192
2.34		176,4
2.35	OMe	110-111

Beispiel	R¹	Schmelzpunkt °C
2.36	ОН	157-159
2.37		118-120
2.38		119-121
2.39	CI	130-132
2.40		128-129
2.41	N-N S F	172-174
2.42	F	155-156
2.43	N-H	167
2.44		178,8
2.45		Öl
2.46		ÖI
2.47		140-142

Beispiel	. R¹	Schmelzpunkt
2.48		116-118
2.49		96-99
2.50		169,4
2.51		145-147
2.52		141,1
2.53		160,6
2.54		134,3
2.55		Öl
2.56		157,5
2.76	H ₃ C	195
2.77	H ₃ C CI	198
2.78	H ₃ C CI	192

Beispiel	R¹	Schmelzpunkt °C
2.79	H ₃ C	215
2.80	H ₃ C	161
2.81	H ₃ C OMe	169
2.82	H ₃ C OMe	132
2.83	N CI	194

$$\begin{array}{c}
0\\
N \\
R^{2}\\
N-R^{3}
\end{array}$$

 $R^2 = -CH_3$ $R^9 = H$

$$R^3 = -CH_2$$

. 10

Beispiel	R¹	Schmelzpunkt °C
2.57	—(CH ₂)	ÖI

$$R^{5}$$
 R^{6}
 $N = R^{3}$
 R^{9}

$$R^{2}$$
, $R^{9} = H$

Beispiel	R ⁶	R⁵	R⁴	R³	R¹	Schmelzpunkt °C
2.58	Н	CI	H	-CH ₂		Öl
2.59	Ŧ	Н	C	-CH ₂	—CH ₂ —CI	135-136
2.60	Н	CI	Н	-CH ₂	(CH ₂) ₃	ÖI

Beispiel	R ⁶	R⁵	R ⁴	R³	R¹	Schmelzpunkt °C
2.61	Н	H	CI	-CH ₂		193-195
2.62	Н	CI	Н	-CH ₂		186,8
2.63	Н	F	Н	-CH ₂		Öl
2.64	Н	CI	Н	-CH ₂		ÖI
2.65	F	Н	Н	-CH ₂ N		168,6
2.66	H	CI	Н	-CH ₂		Öl
2.67	Н	F	Н	-CH ₂		Öl
2.68	Н	CI	Н	-CH ₂ V	N CI	Öl
2.69	Η	F	Н	-CH ₂	N CI	ÖI
2.84	CI	Н	Н	-CH ₂ —		165.6
2.85	Н	Н	F	-CH ₂	N	Harz
2.86	F	F	Н	-CH ₂ ——N	N	206.0

Beispiel	R ⁹	R³	В	Schmelzpunkt °C
2.70	. Н	—CH ₂ —		ÖI
2.71	Н	—CH ₂ —		136,8
2.72	H	CH ₂		Öl
2.73	H	−CH ₂ OMe	CI	ÖI
2.74	Н	—CH ₂ ——)	H ₂ N N N N	ÖI
2.75	Н	—CH ₂	, CI	ÖI

Beispiel 3.0

5 Herstellung von N-(4-Chlorbenzyl)-N2-(4-methoxybenzyl)anthranilamid

425 mg N –(4 – Methoxybenzyl)isatosäureanhydrid werden in 20 ml Tetrahydrofuran p.A. gelöst, mit 234 mg 4-Chlorbenzylamin versetzt und 4 Stunden am Rückfluß erhitzt. Die Reaktionslösung wird im Vakuum eingeengt, in Essigester aufgenommen, gewaschen, getrocknet, filtriert und im Vakuum eingeengt. Der Rückstand wird aus Ethylalkohol umkristallisiert.

Man erhält die Titelverbindung vom Schmelzpunkt 130,5 °C.

15

10

In analoger Verfahrensweise werden auch folgende Verbindungen hergestellt:

$$\begin{array}{c|c}
 & R^1 \\
 & R^2 \\
 & R^3 \\
 & R^9
\end{array}$$

20

$$R^{2}$$
, $R^{9} = H$

Beispiel	R³	R¹	Schmelzpunkt °C
3.1	—CH ₂ —QMe	—СН ₂ —ОМе	100,7
3.2	—CH ₂ —OMe	(CH ₂)2	110,5

Beispiel 4.0

5

10

Herstellung von N-[2-(4-Chlorphenyl)ethyl]-N2-(4-hydroxybenzyl)anthranilamid

71 mg N-[2-(4-Chlorphenyl)ethyl]-N2-(4-methoxybenzyl)anthranilamid werden unter Stickstoffatmosphäre in 2 ml absolutem Dimethylformamid gelöst und mit 76 mg Natriumthiomethylat versetzt. Das Reaktionsgemisch wird 1,5 Stunden am Rückfluß erhitzt. Nach dem Abkühlen wird mit 30 ml Wasser versetzt und anschließend mit Essigester extrahiert. Die organische Phase wird gewaschen, getrocknet, filtriert und im Vakuum zur Trockene eingeengt. Der Rückstand wird über Kieselgel mit Hexan + Essigester (7 + 3) als Elutionsmittel chromatographiert.

15 Man erhält 23 mg der Titelverbindung vom Schmelzpunkt 103 – 105 °C.

Beispiel 5.0

5

Herstellung von 2-[(-2-Chlorpyridin-4-yl)methyl]amino]-N-(isochinolin-3-yl)benzoesäureamid

300mg 2-[Amino]-N-(isochinolin-3-yl)benzoesäureamid werden in 6ml Methanol mit 0,06ml Eisessig und 523mg einer 39%igen Lösung von 2-Chlor-4-pyridincarbaldehyd in Methylenchlorid und Essigester versetzt und 20h bei
Raumtemperatur unter Argon gerührt. Anschliessend werden 96mg
Natriumcyanoborhydrid zugegeben und 6h bei Raumtemperatur gerührt. Nach Einengen am Vakuum wird der Rückstand in 30ml einer verdünnten Lösung von Natrimhydrogencarbonat in Wasser aufgenommen und mit Essigester extrahiert. Die Essigesterphase wird mit Wasser gewaschen, getrocknet, filtriert und eingeengt. Der Rückstand wird über Kieselgel mit Essigester als Elutionsmittel chromatographiert. Nach Zusammenfassen und Einengen der entsprechenden Fraktionen erhält man 56mg 2-[(-2-Chlorpyridin-4-yl)methyl]amino]-N-(isochinolin-3-yl)benzoesäureamid.

In analoger Verfahrensweise werden auch folgende Verbindungen hergestellt:

Beispiel	R ^t .	R³	R ⁶	R⁵	Schmelzpunkt °C
5.1		N OH	Н	н	ÖI
5.2		ОН	Н	Н	238.3
5.3		ОН	F	Н	Öl
5.4		№ он	Н	F	ÖI
5.5		₩ OH	CI	Н	ÖI
5.6			Н	Н	171.8
5.7		N OMe	Н	Н	ÖI
5.8		ОН	F	н	ÖI
5.9		ОН	Н	н	ÖI

Beispiel	R ¹ .	R³	R ⁶	R⁵	Schmelzpunkt °C
5.10		C _C	Н	F	ÖI
5.11	Ph	№ ОН	Н	Н	ÖI
5.12		Z = 2	F	Н	ÖI
5.13		Z = 2	Н	F	156.1
5.14	NO	NH NH	н	F	ÖI .
5.15		Z H	F	Н	ÖI
5.16		Z= 2	F	Н	238.6
5.17		NH NH	Н	Н	ÖI
5.18	T, o		H	н	ÖI .

Beispiel 6.0

5

Herstellung von 2-[[(1,2-Dihydro-1-methyl-2-oxopyridin-4-yl)methyl]amino]-N-(isochinolin-3-yl)benzoesäureamid

80mg 2-[[(1,2-Dihydro-2-oxopyridin-4-yl)methyl]amino]-N-(isochinolin-3-yl)benzoesäureamid in 2ml Dimethylformamid werden unter Argon mit 10mg Natriumhydrid (80%ig) versetzt und 30min auf 60°C erwärmt. Anschliessend werden 0,015ml Methyljodid in 0,5ml Dimethylformamid zugetropft und 1h auf 60°C erwärmt. Nach Abkühlen wird der Ansatz in eine Lösung von Natriumhydrogencarbonat gegeben und mit Essigester extrahiert. Die Essigesterphase wird gewaschen, getrocknet und eingeengt und der Rückstand über Kieselgel mit Methylenchlorid:Ethanol=97:3 als Elutionsmittel. Man erhält 30mg 2-[[(1,2-Dihydro-1-methyl-2-oxopyridin-4-yl)methyl]amino]-N-(isochinolin-3-yl)benzoesäureamid.

In analoger Verfahrensweise werden auch folgende Verbindungen hergestellt:

Beispiel R¹ R⁶ Schmelzpunkt °C 6.1 Н Н 6.2 ÖI Н Н 6.3 Öl F Н 6.4 Öl Н F 6.5 ÖI CI Н 6.6 Н ÖI Н 6.7 Н ÖI Н

Beispiel 7.0

Herstellung von 2-[(-2-Methoxypyridin-4-yl)methyl]amino]-N-(isochinolin-3-yl)benzoesäureamid und 2-[[(1,2-Dihydro-1-methyl-2-oxopyridin-4-yl)methyl]amino]-N-(isochinolin-3-yl)benzoesäureamid

130mg 2-[[(1,2-Dihydro-2-oxopyridin-4-yl)methyl]amino]-N-(isochinolin-3-yl)benzoesäureamid werden in 4ml einer Mischung aus Toluol: Methanol=1:3,5
vorgelegt und mit 0,2ml einer 2-molaren Lösung von Trimethylsilyldiazomethan in Hexan versetzt und 8h bei Raumtemperatur gerührt. Nach nochmaliger Zugabe von 0,2ml der Trimethylsilyldiazomethanlösung und 1h Rühren wird der Ansatz zur Trockene eingeengtund über Kieselgel mit Methylenchlorid:Ethanol=97:3 als Elutionsmittel chromatographiert. Man erhält 20mg 2-[(-2-Methoxypyridin-4-yl)methyl]amino]-N-(isochinolin-3-yl)benzoesäureamid und 10mg 2-[[(1,2-Dihydro-1-methyl-2-oxopyridin-4-yl)methyl]amino]-N-(isochinolin-3-yl)benzoesäureamid.

In analoger Verfahrensweise werden auch folgende Verbindungen hergestellt:

Beispiel	R¹	R³	R ⁶	R⁵	Schmelzpunkt °C
7.1		OMe	Н	Н	ÖI
7.2		OMe	н	н	ÖI
7.3	Ç,	OMe	F	н	ÖI
7.4	N C	OMe	Н	F	ÖI
7.5		ОМе	CI	Н	ÖI
7.6		N	Н	Н	ÖI
7.7		N OMe	Н	Н	Öl

Beispiel 8.0

Herstellung von N-(Indazol-5-yl) N2-(4-pyridylmethyl)-anthranilsäureamid

5

10

228 mg N-(4-Pyridylmethyl)-anthranilsäure werden in 10 ml Dimethylformamid unter Argon und Feuchtigkeitsausschluß vorgelegt. 266 mg 5-Aminoindazol, 0,27 ml Methylmorpholin und 456 mg O-(7-Azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat (HATU) werden hinzugefügt. Die Mischung wird anschließend 4 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Dann wird mit verdünnter Natriumhydrogenkarbonat-Lösung versetzt und dreimal mit Essigester extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser gewaschen, getrocknet, filtriert und im Vakuum eingeengt. Der Rückstand wird über Kieselgel mit Essigester als Elutionsmittel chromatographiert.

15

Durch Ausrühren in Aceton erhält man 245 mg der Titelverbindung vom Schmelzpunkt 209,8 °C.

In analoger Verfahrensweise werden auch folgende Verbindungen hergestellt:

 $R^3 =$

Beispiel R¹ R⁶ Schmelzpunkt °C R⁵ 8.1 CI Н ÖI 8.2 Н Н 206 8.3 ÖI F Н 8.4 Н F 58.7 8.5 ŐI CI Н 8.6 ÖI F Н 8.7 Н H 211,7 8.8 Н 140.4 Н

Beispiel	R ¹	R ⁶	R⁵	Schmelzpunkt °C
8.9	SOF	Н	Н	188,5
8.10		Н	Н	258,2
8.11		Н	Н	152,6
8.12	H ₃ C	Н	Н	199,7
8.13	-NCI	Н	Н	178,3
8.14		Н	Н	243
8.15		Н	Н	ÖI
8.16	-STOF	Н	H	230,4
8.17	Z CI	Н	Н	ÖI
8.18	Z S	H	CI	235-236
8.19		Н	F	236
8.20		H	CI	228,1
8.21	$-\langle \rangle$	Н	Н	Öl

Beispiel	R¹	R⁰	R⁵	Schmelzpunkt °C
8.22	-N S	н	F	197.6
8.23	N _S	Н	CI	59.1

Das nachfolgende Beispiel erläutert die Herstellung der erfindungsgemäßen Zwischenprodukte, ohne die Erfindung auf diese Beispiele zu beschränken.

5 .

Beispiel 9.0

Herstellung von N –(4 – Methoxybenzyl)isatosäureanhydrid als Zwischenprodukt zur Herstellung der erfindungsgemäßen Endprodukte.

10

15

20

Unter Stickstoffatmosphäre wird eine Lösung aus 5 g Isatosäureanhydrid und 100 ml N,N – Dimethylacetamid in einem Eisbad gekühlt und portionsweise mit 1,35 g Natriumhydrid (Öl ~60%ig) versetzt. Das Reaktionsgemisch wird anschließend 30 Minuten bei Raumtemperatur und weitere 30 Minuten bei 60°C Badtemperatur gerührt. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur werden unter Rühren 5 ml 4-Methoxybenzaldehyd eingetropft und über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Das Reaktionsgemisch wird im Vakuum eingeengt und auf 100 ml Eis/Wasser gegossen. Der Niederschlag wird abgetrennt, in 50 ml Methylenchlorid aufgenommen, gewaschen, getrocknet, filtriert und im Vakuum eingeengt. Der Rückstand wird aus Alkohol umkristallisiert.

Man erhält 3,4 g der Titelverbindung vom Schmelzpunkt 143 °C.

In analoger Verfahrensweise werden auch folgende Verbindungen hergestellt:

Beispiel	R ³	Schmelzpunkt °C
9.1	—CH ₂ —Br	ÖI
9.2	—СН ₂ —СН ₃	Öl

Beispiel 10.0

Herstellung von N-(4-Pyridylmethyl)-anthranilsäure als Zwischenprodukt zur Herstellung der erfindungsgemäßen Endprodukte

2 g N-(4-Pyridylmethyl)-anthranilsäuremethylester werden in 15 ml Methanol gelöst, mit 16 ml 1 N Natronlauge versetzt und 1 Stunde unter Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen wird das Methanol unter Vakuum abdestilliert und der Rückstand mit 20 ml Wasser und 20 ml 1 N Zitronensäurelösung versetzt. Die Kristalle werden abgesaugt, mit Wasser gewaschen und getrocknet.

Man erhält 1,7 g der Titelverbindung vom Schmelzpunkt 208,0 °C.

10

Beispiel 11.0

Herstellung von N-(Indazol-5-yl)-5-chloranthranilsäureamid als Zwischenprodukt zur Herstellung der erfindungsgemäßen Endprodukte

171mg 5-Chloranthranilsäure werden in 10ml Dimethylformamid unter Argon und Feuchtigkeitsausschluß vorgelegt und nacheinander mit 253mg N-Methylmorpholin, 266mg 5-Aminoindazol und 456mg O-(7-Azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat (HATU) versetzt und für 4h bei Raumtemperatur gerührt. Nach Stehen über Nacht wird mit 50ml Wasser versetzt und mit 30ml Essigester extrahiert. Die organische Phase wird mit Wasser gewaschen, getrocknet, filtriert und eingeengt. Der Rückstand wird über Kieselgel mit Essigester als Elutionsmittel chromatographiert. Man erhält 266mg N-(Indazol-5-yl)-5-chloranthranilsäureamid.

Die nachfolgenden Anwendungsbeispiele erläutern die biologische Wirkung und Verwendung der erfindungsgemäßen Verbindungen ohne diese auf die Beispiele zu beschränken.

5

Für die Versuche benötigte Lösungen

Stammlösungen

Stammlösung A: 3mM ATP in Wasser pH 7,0 (-70°C)

Stammlösung B: g-33P-ATP 1mCi/ 100µl

10 Stammlösung C: poly-(Glu4Tyr) 10mg/ ml in Wasser

Lösung für Verdünnungen

Substratlösemittel: 10mM DTT, 10 mM Manganchlorid, 100 mM

Magnesiumchlorid

15 Enzymlösung: 120 mM Tris/ HCl, pH 7,5, 10 μM Natriumvanadiumoxid

Anwendungsbeispiel 1

20 Hemmung der KDR- und FLT-1 Kinaseaktivität in Gegenwart der erfindungsgemäßen Verbindungen

In einer spitz zulaufenden Mikrotiterplatte (ohne Proteinbindung) werden 10 μl Substratmix (10μl Vol ATP Stammlösung A + 25μCi g-33P-ATP (ca. 2,5 μl der Stammlösung B) + 30μl poly-(Glu4Tyr) Stammlösung C + 1,21ml Substratlösemittel), 10 μl Hemmstofflösung (Substanzen entsprechend den Verdünnungen, als Kontrolle 3% DMSO in Substratlösemittel) und 10 μl Enzymlösung (11,25μg Enzymstammlösung (KDR oder FLT-1 Kinase) werden bei 4°C in 1,25ml Enzymlösung verdünnt) gegeben. Es wird gründlich durchgemischt und bei 10 Minuten Raumtemperatur inkubiert. Anschließend gibt man 10μl Stop-Lösung (250mM EDTA, pH 7,0) zu, mischt und überträgt 10 μl der Lösung auf einen P 81 Phosphozellulosefilter. Anschließend wird

mehrfach in 0,1M Phosphorsäure gewaschen. Das Filterpapier wird getrocknet, mit Meltilex beschichtet und im Microbetazähler gemessen.

Die IC50-Werte bestimmen sich aus der Inhibitorkonzentration, die notwendig ist, um den Phosphateinbau auf 50% des ungehemmten Einbaus nach Abzug des Leerwertes (EDTA gestoppte Reaktion) zu hemmen.

Die Ergebnisse der Kinase-Inhibition IC50 in μM sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

٩	1	٦	ı
ı	u	J	ľ
7		•	

Beispiel-Nr.	VEGFR I	VEGFR II
	(FLT)	(KDR)
2.0	0,05	0,05
2.1	0,01	0,3
2.2	0,1	0,5
2.3	0,02	0,02
2.4	0,02	0,1
2.5	1	10
2.6	0,2	2
2.8	0,5	0,1
2.9	5	1
2.10	3	10
2.11	0,02	0,2
2.12	0,7	3
2.13	0,7	3
2.14	0,5	0,3
2.15	1,0	KH
2.16	0,1	0,2
2.17	0,4	0,5
2.18	0,3	0,5
2.19	>10	>10

Beispiel-Nr.	VEGFR I	VEGFR II
·	(FLT)	(KDR)
2.20	4	KH
2.21	2	0,3
2.23	0,02	0,67
2.24	0,5	>1
2.25	0,3	0,2
2.26	0,2	0,2
2.27	0,02	0,02
2.28	1	2
2.29	2	3
2.30	0,005	0,02
2.31	0,1	0,27
2.32	0,02	0,02
2.33	1	2
2.34	2	0,1
2.35	0,098	0,02
2.36	0,05	0,2
2.37	0,2	
2.38	7	0,2
2.39	0,05	0,03
2.40	0,5	
2.41	1	0,3
2.42	0,5	0,1
2.43	0,02	0,05
2.44	0,3	0,2
2.45	0,1	1
2.46	0,04	0,05
2.47	0,02	1
2.48	0,1	0,5

Beispiel-Nr.	VEGFR I	VEGFR II
·	(FLT)	(KDR)
2.49	0,08	0,05
2.50	KH	KH
2.51		
2.52	0,05	
2.53	0,02	0,02
2.54	. 0,02	0,005
2.55	0,3	0,2
2.56	0,04	0,02
2.57	KH	KH
2.58	0,5	5
2.59	50	KH
2.60	0,5	0,7
2.61	10	10
2.63		0,0003
2.64	0,04	0,04
2.65		0,0002
2.74	1	КН
2.75	0,3	5
3.0	KH	3,0
3.2	2,0	2,0
4.0	0,5	0,2
8.0	0,04	0,04
8.2	0,2	0,2
8.3	0,05	0,04
8.8	0,05	0,02
8.9	0,5	0,5
8.10	0,02	0,02
8.11	0,2	1

Beispiel-Nr.	VEGFR I	VEGFR II
	(FLT)	(KDR)
8.12	0,2	0,1
8.13	0,5	0,5
8.14	0,5	0,2
8.15	0,2	0,2
8.16	0,2	0,3
8.17	·	0,05
8.18		0,05

KH= keine Hemmung

Patentansprüche

1. Verbindungen der allgemeinen Formel I

5

$$R^5$$
 R^6
 R^7
 R^3

in der

Α

für die Gruppe =NR2 steht,

10 V

für Sauerstoff, Schwefel, zwei Wasserstoffatome

oder die Gruppe =NR⁸ steht,


Z

für die Gruppe = NR^{10} oder =N-, - $N(R^{10})$ -(CH_2)_q-,

verzweigtes oder unverzweigtes C₁₋₆-Alkyl oder die

Gruppe

15



steht,

oder A, Z und R¹ gemeinsam die Gruppe

10

bilden,

m, n und o

für 0 - 3 steht,

q

für 1 – 6 steht

Ra, Rb, Rc, Rd, Re, Rr

unabhängig voneinander für Wasserstoff,

 C_{1-4} Alkyl oder die Gruppe =NR¹⁰ stehen und / oder R_a und oder R_b mit R_c und oder R_d oder R_c mit R_b und oder R_f eine Bindung bilden können, oder bis zu zwei der Reste R_a - R_f eine Brücke mit je bis zu 3 C-Atomen zu R^1 oder zu

R² schließen können,

15 X

für die Gruppe =NR⁹ oder =N- steht,

Υ

für die Gruppe -(CH₂)_p steht,

р

für 1-4 steht,

R¹

für unsubstituiertes oder gegebenenfalls ein-

oder mehrfach mit Halogen, C_{1-e}-Alkyl, ein-

oder mehrfach mit Halogen substituiertes C₁₋₆-

Alkyl oder C₁₋₆-Alkoxy substituiertes Aryl oder

Heteroaryl steht, mit Ausnahme der

Verbindungen, in denen Aryl unmittelbar an

20

			die =NR ² Gruppe in der Bedeutung von A
			gebunden ist,
		R ²	für Wasserstoff oder C ₁₋₆ -Alkyl steht oder mit
5			R_a - R_f von Z oder zu R_1 eine Brücke mit bis zu
			3 Ringgliedern bildet,
		R³	für unsubstituiertes oder gegebenenfalls ein-
			oder mehrfach mit Halogen, C ₁₋₆ -Alkyl, C ₁₋₆ -
			Alkoxy oder Hydroxy, substituiertes
10			monozyklisches oder bizyklisches Aryl oder
			Heteroaryl steht,
		R^4 , R^5 , R^6 und R^7	unabhängig voneinander für Wasserstoff,
			Halogen oder unsubstituiertes oder
			gegebenenfalls ein- oder mehrfach mit
15			Halogen substituiertes C _{1.6} -Alkoxy, C _{1.6} -Alkyl,
			C ₁₋₈ -Carboxyalkyl stehen,
			oder R⁵ und R⁵ gemeinsam die Gruppe
			,0,
			CH ₂
			bilden,
20		R ⁸ , R ⁹ und R ¹⁰	unabhängig voneinander für Wasserstoff oder
			C ₁₋₆ -Alkyl stehen,
			bedeuten, sowie deren Isomeren und Salze.
			daze.
25	2.	Verbindungen der all	gemeinen Formel I, gemäß Anspruch 1, in der
		٨	for die One and Aim?

A für die Gruppe =NR² steht,


W für Sauerstoff, Schwefel, zwei

Wasserstoffatome oder die Gruppe =NR³

steht,

Z

für die Gruppe =NR 10 , =N- oder -N(R 10)-(CH $_2$) $_q$ -, verzweigtes oder unverzweigtes C $_{1.6}$ -Alkyl oder die Gruppe



5

steht, oder A, Z und R¹ gemeinsam die Gruppe

10

15

bilden,

m, n und o für 0-3 steht, q für 1-6 steht,

R_a, R_b, R_c, R_d, R_e, R_f unabhängig voneinander für Wasserstoff,

 C_{1-4} Alkyl oder die Gruppe =NR¹⁰ stehen, X für die Gruppe =NR⁹ oder =N- steht,


Y für die Gruppe -(CH₂)_p steht,

p für 1-4 steht,

R¹ für Phenyl, Pyridyl, 5-Chlor-2,3-

Dihydroindenyl, 2,3-Dihydroindenyl, Thienyl,

6-Fluor-1H-indol-3-yl, Naphthyl, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthyl, Benzo-1,2,5-oxadiazol, 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphtyl oder für ein-oder mehrfach mit C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄- Alkoxy, Hydroxy, Halogen, Trifluormethyl, substituiertes Phenyl oder Pyridyl oder für die Gruppe



	H ₃ C	H,C F, CL OCH,
--	------------------	----------------

R²

10

 R^3

15

R⁴, R⁵, R⁶ und R⁷

20

steht, wobei Phenyl, substituiertes Phenyl oder Naphthyl nicht unmittelbar an der $=NR^2$ Gruppe in der Bedeutung von A stehen, für Wasserstoff oder C_{1-8} -Alkyl steht oder mit R_a - R_f von Z oder zu R_1 eine Brücke mit bis zu 3 Ringgliedern bildet,

für unsubstituiertes oder gegebenenfalls einoder mehrfach mit Halogen C₁₋₈-Alkyl, C₁₋₆-Alkoxy oder Hydroxy, substituiertes monozyklisches oder bizyklisches Aryl oder monozyklisches oder bizyklisches Heteroaryl steht,

unabhängig voneinander für Wasserstoff, Halogen oder unsubstituiertes oder gegebenenfalls ein- oder mehrfach mit Halogen substituiertes C₁₋₈-Alkoxy oder C₁₋₆-Alkyl stehen, oder R⁵ und R⁶ gemeinsam die Gruppe

25

bilden.

R8, R9 und R10

unabhängig voneinander für Wasserstoff oder C_{1-3} -Alkyl stehen,

bedeuten, sowie deren Isomeren und Salze.

Verbindungen der allgemeinen Formel I, gemäß den Ansprüchen 1 und
 in der

z, in de

Α

5

für die Gruppe =NR² steht,

W


für Sauerstoff, Schwefel oder zwei

Wasserstoffatome steht,

Z

für die Gruppe = NR^{10} , =N-, - $N(R^{10})$ -(CH_2)_q-

oder die Gruppe



10

steht, oder A, Z und R¹ gemeinsam die Gruppe

bilden,

15

m, n und o

für 0 - 3 stehen,

q

für 1 - 6 steht,

 R_a , R_b , R_c , R_d , R_e , R_f

unabhängig voneinander für Wasserstoff der

Methyl oder die Gruppe =NR¹⁰ stehen,

X


für die Gruppe =NR9 oder =N- steht,

 \mathbf{Y} \mathbf{R}^{1}

5

10

für die Gruppe -CH₂- steht, für Phenyl, Pyridyl, p-Chlorphenyl, p-Methylphenyl, p-Methoxyphenyl, 5-Chlor-2,3-Dihydroindenyl, 2,3-Dihydroindenyl, Thienyl, 6-Fluor-1H-indol-3-yl, Naphthyl, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthyl, Benzo-1,2,5-oxadiazol, 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphtyl, oder für ein oder mehrfach mit C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Hydroxy, Halogen, Trifluormethyl, substituiertes Phenyl oder Pyridyl oder für die Gruppe



-{\(\)CH3	H,C
H ₃ C	H,C , C , C , C , C , C , C , C , C , C

 R^2

 R^3

10

steht, wobei Phenyl oder substituiertes Phenyl oder Naphthyl nicht unmittelbar an der =NR² Gruppe in der Bedeutung von A stehen, für Wasserstoff oder Methyl steht, für Pyridyl oder durch Hydroxy, Halogen, Methyl oder Methoxy substituiertes Phenyl oder 1,2,3,4-Tetrahydronaphthyl oder für die Gruppe

Z'n	NOMe	EH,
I N	NOH	
NA H		

15 R⁵ und R6

steht, unabhängig voneinander für Wasserstoff, Halogen, Methyl, Methoxy oder Trifluormethyl stehen, R⁴ und R⁷

unabhängig voneinander für Wasserstoff

stehen,

R⁹

für Wasserstoff steht,

R¹⁰

. 5

für Wasserstoff oder Methyl steht, bedeuten,

sowie deren Isomeren und Salze.

4. Verbindungen der allgemeinen Formel I, gemäß den Ansprüchen 1 bis 3,

10 in der

Α

für die Gruppe =NR2 steht,


W

für Sauerstoff steht,

Z

für die Gruppe =NR¹⁰, =N-,

-N(R^{10})-(CH_2)_q- oder die Gruppe



15

steht, oder A, Z und R¹ gemeinsam die Gruppe

bilden,


m, n und o für 0 - 3 stehen, für 1 - 6 steht, 5 q R_a , R_b , R_c , R_d , R_a , R_t unabhängig voneinander für Wasserstoff oder Methyl oder die Gruppe =NR¹⁰ stehen,

> für die Gruppe =NR9 oder =N- steht, X Y für die Gruppe -CH2- steht, R^1 für Phenyl, Pyridyl, 5-Chlor-2,3-

Dihydroindenyl, 2,3-Dihydroindenyl, Thienyl, 6-Fluor-1H-indol-3-yl, Naphthyl, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthyl, Benzo-1,2,5-oxadiazol oder 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2naphtyl oder für ein- oder mehrfach mit C₁-C₄-

Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Hydroxy, Halogen, Trifluormethyl, substituiertes Phenyl oder

Pyridyl oder für die Gruppe



20

10

15


r		
- SII a	- SID _F	
		- S
		~STO
\$II		CH,
H _y C		
CT _s	H ₃ C	H _c C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

 R^2

 R^3

10

steht, wobei Phenyl, oder substituiertes
Phenyl oder Naphthyl nicht unmittelbar an der
=NR² Gruppe in der Bedeutung von A stehen,
für Wasserstoff oder Methyl steht,
für Pyridyl oder für ein- oder mehrfach mit
Hydroxy, Halogen, Methyl oder Methoxy
substituiertes Phenyl, Pyridyl oder 1,2,3,4Tetrahydronaphthyl oder für
die Gruppe



steht,

5 R⁵ und R⁶ unabhängig voneinander für Wasserstoff,

Halogen, Methyl, Methoxy oder Trifluormethyl

stehen,

R⁴ und R⁷ unabhängig voneinander für Wasserstoff und

Halogen stehen,

10 R⁹ für Wasserstoff steht,

R¹⁰ für Wasserstoff oder Methyl steht, bedeuten,

sowie deren Isomeren und Salze.


15 5. Verbindungen der allgemeinen Formel I, gemäß den Ansprüchen 1 bis 3, in der

A für die Gruppe =NR² steht,

W für Schwefel steht,

Z

für die Gruppe =NR¹⁰, =N-, -N(R¹⁰)-(CH₂)_q- oder die Gruppe



5

15

steht, oder A, Z und R¹ gemeinsam die Gruppe

bilden,

m, n und o für 0-3 stehen, $q \qquad \qquad \text{für } 1-6 \text{ steht,}$ $R_a, R_b, R_c, R_d, R_e, R_f \qquad \text{unabhängig voneinander für Wasserstoff oder}$

Methyl oder die Gruppe =NR¹º stehen,

X für die Gruppe =NR⁹ oder =N- steht,

Y für die Gruppe -CH₂- steht, R¹ für Phenyl, Pyridyl, 5-Chlor-2,3-

Dihydroindenyl, 2,3-Dihydroindenyl, Thienyl, 6-Fluor-1H-indol-3-yl, Naphthyl, 1,2,3,4-

Tetrahydronaphthyl, Benzo-1,2,5-oxadiazol oder 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphtyl oder für ein- oder mehrfach mit C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Hydroxy, Halogen, Trifluormethyl, substituiertes Phenyl oder Pyridyl oder für die Gruppe

	The second secon	
N CI		
S CF ₃		-0-0
	-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
		- S
		S Cocf,
		H CH,


5

 R^2

 R^3

10

steht, wobei Phenyl, oder substituiertes
Phenyl oder Naphthyl nicht unmittelbar an der
=NR² Gruppe in der Bedeutung von A stehen,
für Wasserstoff oder Methyl steht,
für Pyridyl oder für ein- oder mehrfach mit
Hydroxy, Halogen, Methyl oder Methoxy
substituiertes Phenyl, Pyridyl oder 1,2,3,4Tetrahydronaphthyl oder für die Gruppe



steht,

R⁵ und R6

unabhängig voneinander für Wasserstoff,

Halogen, Methyl, Methoxy oder Trifluormethyl

stehen,

R⁴ und R7

unabhängig voneinander für Wasserstoff und

Halogen stehen,

 R^9

für Wasserstoff steht,

 R^{10}

für Wasserstoff oder Methyl steht, bedeuten,

sowie deren Isomeren und Salze.

6. Verbindungen der allgemeinen Formel I, gemäß den Ansprüchen 1 bis 3, in der

15

5

Α

für die Gruppe =NR2 steht,

W

für zwei Wasserstoffatome steht.

Z

für die Gruppe =NR¹⁰, =N-,

-N(R¹⁰)-(CH₂)_q- oder die Gruppe

20

steht, oder A, Z und R¹ gemeinsam die Gruppe

bilden,

m, n und o

für 0 - 3 stehen,

5 q

für 1 – 6 steht,

 R_a , R_b , R_c , R_d , R_e , R_f

Υ

unabhängig voneinander für Wasserstoff oder

Methyl oder die Gruppe =NR¹⁰ stehen,

X für die Gruppe =NR9 oder =N- steht,

für die Gruppe -CH₂- steht,

R¹ für Phenyl, Pyridyl, 5-Chlor-2,3-

Dihydroindenyl, 2,3-Dihydroindenyl, Thienyl,

6-Fluor-1H-indol-3-yl, Naphthyl, 1,2,3,4-

Tetrahydronaphthyl, Benzo-1,2,5-oxadiazol

oder 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-

naphtyl oder für ein- oder mehrfach mit C₁-C₄-

Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Hydroxy, Halogen,

Trifluormethyl, substituiertes Phenyl oder

Pyridyl oder für die Gruppe

15

10

-\sum_a	-SIDF	
		-
		-\sum_ocf,
\$II		от Сн, Сн,
H,C	$-\bigcirc$	(C)
CX,	H ₃ C	H,C T F, CI, OCH,

 R^2

 R^3

10

steht, wobei Phenyl, oder substituiertes
Phenyl oder Naphthyl nicht unmittelbar an der
=NR² Gruppe in der Bedeutung von A stehen,
für Wasserstoff oder Methyl steht,
für Pyridyl oder für ein- oder mehrfach mit
Hydroxy, Halogen, Methyl oder Methoxy
substituiertes Phenyl, Pyridyl oder 1,2,3,4Tetrahydronaphthyl oder für die Gruppe

steht,

R⁴ und R⁷ unal

unabhängig voneinander für Wasserstoff,

Halogen, Methyl, Methoxy oder Trifluormethyl

stehen,

R⁵und R⁵ unabhängig voneinander für Wasserstoff und

Halogen stehen,

R⁹ für Wasserstoff steht,

10 R¹⁰ für Wasserstoff oder Methyl steht, bedeuten,

sowie deren Isomeren und Salze.

Verwendung der Verbindungen der allgemeinen Formel I, gemäß den
 Ansprüchen 1 bis 6, zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Tumoren, Psoriasis, Arthritis, wie rheumatoide Arthritis, Hämangioma, Angiofribroma, Augenerkrankungen, wie diabetische Retinopathie, Neovaskulares Glaukom, Nierenerkrankungen, wie Glomerulonephritis, diabetische Nephropatie, maligne Nephrosklerose, thrombische mikroangiopatische Syndrome, Transplantationsabstoßungen und Glomerulopathie, fibrotische Erkrankungen, wie

Leberzirrhose, mesangialzellproliferative Erkrankungen, Artheriosklerose, Verletzungen des Nervengewebes und zur Hemmung der Reocclusion von Gefäßen nach Ballonkathetherbehandlung, bei der Gefäßprothetik oder nach dem Einsetzen von mechanischen Vorrichtungen zum Offenhalten von Gefäßen wie z. B. Stents.

- 8. Arzneimittel, enthaltend mindestens eine Verbindung gemäß den Ansprüchen 1 bis 6.
- Arzneimittel gemäß Anspruch 8, zur Behandlung von Tumoren,
 Psoriasis, Arthritis, wie rheumatoide Arthritis, Hämangioma,
 Angiofribroma, Augenerkrankungen, wie diabetische Retinopathie,
 Neovaskulares Glaukom, Nierenerkrankungen, wie Glomerulonephritis,
 diabetische Nephropatie, maligne Nephrosklerose, thrombische
 mikroangiopatische Syndrome, Transplantationsabstoßungen und
 Glomerulopathie, fibrotische Erkrankungen, wie Leberzirrhose,
 mesangialzellproliferative Erkrankungen, Artheriosklerose, Verletzungen
 des Nervengewebes und zur Hemmung der Reocclusion von Gefäßen
 nach Ballonkatheterbehandlung, bei der Gefäßprothetik oder nach dem
 Einsetzen von mechanischen Vorrichtungen zum Offenhalten von
 Gefäßen wie z. B. Stents.

25

 Verbindungen gemäß den Ansprüchen 1 bis 6 und Arzneimittel gemäß den Ansprüchen 6 und 8 mit geeigneten Formulierungs und Trägerstoffen.

10

25

- Verwendung der Verbindungen der Formel I gemäß den Ansprüchen 1 bis 6, als Inhibitoren der Tyrosinkinase KDR und FLT.
- 12. Verwendung der Verbindungen der allgemeinen Formel I gemäß den Ansprüchen 1 bis 6 in die Form eines pharmazeutischen Präparats für die enteral, parenterale und orale Applikation.
 - 13. Isatosäure-Derivate der allgemeinen Formel V

$$R^5$$
 R^4
 A
 Z
 R^1
 W
 R^6
 X
 R^3
 V

- in der R³ R7, X, Y und W die in der allgemeinen Formel I
 beschriebenen Bedeutungen haben und in der A für die Gruppe =NR²
 oder Sauerstoff steht und Z und R¹ gemeinsam eine an X gebundene
 =C=O Gruppe bilden, sowie deren Isomeren und Salze, als
 Zwischenprodukte zur Herstellung der erfindungsgemäßen

 Verbindungen der allgemeinen Formel I.
 - 14. Verbindungen der allgemeinen Formel V, in der
 A und W für Sauerstoff stehen,
 Z und R¹ gemeinsam eine an X gebundene =C=O
 Gruppe bilden,

	Χ .	für die Gruppe =NR ⁹ oder =N- steht,
	Y	für die Gruppe -CH₂- steht,
	R³	für Pyridyl oder durch Hydroxy, Brom, Methyl
5		oder Methoxy substituiertes Phenyl oder
		1,2,3,4-Tetrahydronaphthyl steht,
	R⁵ und R⁴	für Wasserstoff, Halogen, Methyl, Methoxy
		oder Trifluormethyl stehen,
	R⁴und R ⁷	für Wasserstoff stehen,
10	R°	für Wasserstoff steht,

bedeuten, sowie deren Isomeren und Salze, als Zwischenprodukte zur Herstellung der Verbindungen der allgemeinen Formel I.

15. Verbindungen der allgemeinen Formel V, gemäß den Absprüchen 13 und 14, zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Tumoren, Psoriasis, Arthritis, wie rheumatoide Arthritis, Hämangioma, Angiofribroma, Augenerkrankungen, wie diabetische Retinopathie, Neovaskulares Glaukom, Nierenerkrankungen, wie Glomerulonephritis, 20 diabetische Nephropatie, maligne Nephrosklerose, thrombische mikroangiopatische Syndrome, Transplantationsabstoßungen und Glomerulopathie, fibrotische Erkrankungen, wie Leberzirrhose, mesangialzellproliferative Erkrankungen, Artheriosklerose, Verletzungen des Nervengewebes und zur Hemmung der Reocclusion von Gefäßen 25 nach Ballonkathetherbehandlung, bei der Gefäßprothetik oder nach dem Einsetzen von mechanischen Vorrichtungen zum Offenhalten von Gefäßen wie z. B. Stents.

PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7:

C07D 213/38, 409/12, 401/12, 213/40, 413/12, 417/12, 401/14, 405/12, C07C 237/30, C07D 213/61, 265/26, A61K 31/4409, 31/166, A61P 17/00, 35/00

A3

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/27819

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

18. Mai 2000 (18.05.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP99/08478

(22) Internationales Anmeldedatum: 9. November 1999 (09.11.99)

(30) Prioritätsdaten:

9824579.8 199 10 396.8 10. November 1998 (10.11.98) GB 3. März 1999 (03.03.99)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SCHER-ING AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Müllerstrasse 178, D-13342 Berlin (DE). NOVARTIS AKTIENGE-SELLSCHAFT [CH/CH]; Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HUTH, Andreas [DE/DE]; Dammweg 113, D-12437 Berlin (DE). SEIDELMANN, Dieter [DE/DE]; Stierstrasse 14, D-12159 Berlin (DE). THIERAUCH, Karl-Heinz [DE/DE]; Hochwildpfad 47. D-14169 Berlin (DE). BOLD, Guido [CH/CH]; Bleumatthöhe 16, CH-5073 Gipf-Oberfrick (CH). MANLEY, Paul, William [GB/CH]; Bruggweg 12, CH-4144 Arlesheim (CH). FURET, Pascal [FR/FR]; 24, rue du Riegelsbourg, F-68800 Thann (FR). WOOD, Jeanette, Marjorie [NZ/CH]; In den Kleematten 18, CH-4105 Biel-Benken (CH). MESTAN, Jürgen [DE/DE]; Simon-Veit-Gasse 4, D-79312 Emmendingen (DE). BRÜGGEN, Jose [DE/CH]; Schützengasse 5, CH-4125 Riehen (CH). FERRARI, Stefano [IT/CH]; Baselstrasse 63, CH-4132 Muttenz (CH). KRÜGER, Martin [DE/DE]; Heerrufer Weg 7 a, D-13465 Berlin (DE). OTTOW, Eckhard [DE/DE]; Moltkestrasse 48, D-12203 Berlin (DE). MENRAD, Andreas [DE/DE]; Allerstrasse 7, D-16515 Oranienburg (DE). SCHIRNER, Michael [DE/DE]; Birkenallee 12, D-13158 Berlin (DE).

- (74) Anwalt: MAGER, Knut; Müllerstrasse 178, D-13353 Berlin (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten: AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP. LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BI, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 17. August 2000 (17.08.00)

- (54) Title: ANTRHRANILIC ACID AMIDES AND THE USE THEREOF AS MEDICAMENTS
- (54) Bezeichnung: ANTHRANILSÄUREAMIDE UND DEREN VERWENDUNG ALS ARZNEIMITTEL
- (57) Abstract

The invention relates to anthranilic acid amides and the use thereof as medicaments for the treatment of diseases that are triggered by persistent angiogenesis, in addition to intermediate products in the production of anthranilic acid amides.

(57) Zusammenfassung

Es werden Anthranilsäureamide und deren Verwendung als Arzneimittel zur Behandlung von Erkrankungen, die durch persistente Angiogenese ausgelöst werden, sowie deren Zwischenprodukte zur Herstellung der Anthranilsäureamide beschrieben.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
ΑZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Techad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Togo Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Türkei
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Trinidad und Tobago Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi		Uganda
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger		Amerika
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	UZ	Usbekistan
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	VN	Vietnam
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	YU	Jugoslawien
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen	zw	Zimbabwe
CN	China	KR	Republik Korea	PT			
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Portugal Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	Lí	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dānemark	LK	Sri Lanka	SE			
ER	Estland	LR	Liberia	SG	Schweden		
			Liveria	20	Singapur		

tn. atlonal Application No PCT/EP 99/08478

IPC 7	C07D213/38 C07D409/12 C07D40	01/12 C07D213/40	C07D413/12
	C07D417/12 C07D401/14 C07D40 C07D265/26 A61K31/4409 A61K3	05/12 C07C237/30 1/166 A61P17/00	
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national clas	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A011 337 00
	SEARCHED		
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed by classification sy	ication symbols)	
1,0,	CONTRACTOR NOTE		
Documental	tion searched other than minimum documentation to the extent ti	nat such documents are included in th	ne fields searched
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of dat	a base and, where practical, search to	erms used)
С. ООСИМ	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of th	e relevant passages	Relevant to claim No.
Α	US 3 409 668 A (PALAZZO GIUSEPI	DE ET 41.)	
^	5 November 1968 (1968-11-05)	re el AL)	1,8
	cited in the application		
	the whole document		
x	DE 34 06 416 A (AMERICAN CYANA	MID CO)	1,8
	30 August 1984 (1984-08-30)		ŕ
]	claim 1; example 100		
Α	EP 0 564 356 A (FOURNIER IND &	SANTE)	1,8
	6 October 1993 (1993-10-06) cited in the application		
	the whole document		
		1	
Ì		-/	
X Funt	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members	are listed in annex.
' Special ca	ategories of cited documents :	"T" later document published after	er the international filing date
"A" docume	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	or priority date and not in co cited to understand the prin	ontlict with the application but ciple or theory underlying the
	document but published on or after the international	invention "X" document of particular releva	ance; the claimed invention
"L" docume	ant which may throw doubts on priority claim(s) or	cannot be considered novel	l or cannot be considered to hen the document is taken alone
citatio	is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified)		rolve an inventive step when the
other (ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means		one or more other such docu- eing obvious to a person skilled
later th	ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	"&" document member of the sar	me patent family
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the intern	ational search report
1	7 April 2000	08/05/2000	
Name and r	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (-31-70) 340-3016	Bosma. P	

In attonal Application No
PCT/EP 99/08478

all a DOOLUGENED COLOR	PCT/EP 99/08478			
Citation of document, with indication where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US MONTGINOUL, C. ET AL: "Analgesic, anticonvulsant and anti-inflammatory activities of 1H,3H-quinazoline-2,4-diones" retrieved from STN Database accession no. 110:165551h XP002135868 see CAS RN 67116-39-6 & ANN. PHARM. FR. (1989), 46(4), 223-32,	13			
PASTOR, G. ET AL: "Synthesis of new 1H,3H-quinazoline-2,4-diones" BULLETIN DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE., vol. 5-6, no. 2, 1975, pages 1331-1338, XP002135865 SOCIETE FRANCAISE DE CHIMIE. PARIS., FR ISSN: 0037-8968 tables III,1E	13			
HARDTMANN, GOETZ E. ET AL: "Chemistry of 2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione (isatoic anhydrides). 1. Synthesis of N-substituted 2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-diones" JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY., vol. 12, no. 3, 1975, pages 565-572, XP002135866 HETEROCORPORATION. PROVO., US ISSN: 0022-152X see compounds 65-88	13,14			
DE 26 52 144 A (MERCK PATENT GMBH) 18 May 1978 (1978-05-18) claims 1,9; example 2	14,15			
CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 85, no. 3, 19 July 1976 (1976-07-19) Columbus, Ohio, US; abstract no. 21433p, NODA, KANJI ET AL: "Quinazoline compounds" page 701; XP002135867 abstract & JP 50 157383 A (HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., LTD., JAPAN) 19 December 1975 (1975-12-19)	13			
	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US MONTGINOUL, C. ET AL: "Analgesic, anticonvulsant and anti-inflammatory activities of 1H,3H-quinazoline-2,4-diones" retrieved from STN Database accession no. 110:165551h XP002135868 see CAS RN 67116-39-6 & ANN. PHARM. FR. (1989), 46(4), 223-32, PASTOR, G. ET AL: "Synthesis of new 1H,3H-quinazoline-2,4-diones" BULLETIN DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE, vol. 5-6, no. 2, 1975, pages 1331-1338, XP002135865 SOCIETE FRANCAISE DE CHIMIE. PARIS., FR ISSN: 0037-8968 tables III,1E HARDTMANN, GOETZ E. ET AL: "Chemistry of 2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione (isatoic anhydrides). 1. Synthesis of N-substituted 2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-diones" JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY, vol. 12, no. 3, 1975, pages 565-572, XP002135866 HETEROCORPORATION. PROVO., US ISSN: 0022-152X see compounds 65-88 DE 26 52 144 A (MERCK PATENT GMBH) 18 May 1978 (1978-05-18) claims 1,9; example 2 CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 85, no. 3, 19 July 1976 (1976-07-19) Columbus, Ohio, US; abstract no. 21433p, NODA, KANJI ET AL: "Quinazoline compounds" page 701; XP002135867 abstract & JP 50 157383 A (HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., LTD., JAPAN)			

L

1

International application No. PCT/EP 99/08478

Box I	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This inte	rnational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1.	Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. X	Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically: SEE ADDITIONAL MATTER PCT/ISA/210
3.	Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
This Inte	mational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
1.	As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2.	As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3.	As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4.	No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark	The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (1)) (July 1992)

International application No. PCT/EP 99/08478

Continuation of box I.2.

Claims Nos. 1-6 relate to a disproportionately large number of possible compounds of which only a small proportion are supported by the description according to the terms of Article 6 PCT and/or can be considered disclosed according to the terms of Article 5 PCT. In the present case, the patent claims lack the appropriate support and the patent application lacks the required disclosure to such an extent that a meaningful search encompassing the entire scope of protection sought seems impossible. For this reason the search was directed at parts of the claims that seemed to be supported and disclosed according to the above mentioned terms, i.e. parts relating to the compounds as cited in the examples and compounds of general formula I wherein W represesents oxygen.

The applicant's attention is drawn to the fact that claims, or parts of claims relating to inventions in respect of which no international search report has been established need not be the subject of an international preliminary examination (Rule 66.1(e)PCT). EPO policy, when acting as an International Preliminary Examining Authority, is normally not to carry out a preliminary examination on matter which has not been searched. This is the case, irrespective of whether or not the claims are amended following receipt of the search report (Article 19 PCT) or during any Chapter II procedure whereby the applicant provides new claims.

Information on patent family members

ti. ational Application No PCT/EP 99/08478

				101/21 33/004/0			
	atent document d in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
US 	3409668	Α	05-11-1968	FR GB	1458953 1057667		30-01-1967
DE	3406416	Α	30-08-1984	AU	2507284	A	. 06-09-1984
				DÐ	218890	Α	20-02-1985
				DK	77884		29-08-1984
				EP	0117462		05-09-1984
				GR	81797		12-12-1984
				JP	59164779		17-09-1984
				US	4568687		04-02-1986
				ZA	8401447	Α	31-10-1984
EP (0564356	Α	06-10-1993	FR	2689508	A	08-10-1993
				AU	3554693	Α	07-10-1993
				CA	2092852	Α	02-10-1993
				CN	1081438	Α	02-02-1994
				FI		Α -	02-10-1993
			•	HU	64752	Α	28-02-1994
				JP		Α	20-09-1994
				MX	9301882		30-06-1994
				NO	931186		04-10-1993
				ZA	9302351	Α	03-10-1994
DE.	2652144	Α	18-05-1978	NONE			
JP	50157383	A	19-12-1975	JP	1177841	C	30-11-1983
				JP	57044672		22-09-1982

Ints Jonales Aktenzeichen
PCT/EP 99/08478

			21 337 00470			
A. KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES CO7D213/38 CO7D409/12 CO7D401/ CO7D417/12 CO7D401/14 CO7D405/ CO7D265/26 A61K31/4409 A61K31/1	'12 C07C237/30	C07D213/61			
Nach der In	sternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas		A61P35/00			
	RCHIERTE GEBIETE	······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Recherchie IPK 7	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol C07D C07C A61K A61P	ole)				
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierte	on Gebiete fallen			
Während de	er internationalen Recharche konsultierte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evil. ve	rwendele Suchbegriffe)			
	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Tei	le Betr. Anspruch Nr.			
А	US 3 409 668 A (PALAZZO GIUSEPPE 5. November 1968 (1968-11-05) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	ET AL)	1,8			
X	DE 34 06 416 A (AMERICAN CYANAMID 30. August 1984 (1984-08-30) Anspruch 1; Beispiel 100) CO)	1,8			
А	EP 0 564 356 A (FOURNIER IND & SA 6. Oktober 1993 (1993-10-06) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	ANTE)	1,8			
		-/				
entn	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfar	nilie			
"A" Veröffe aber n	e Kategorien von angegebenen Veröffenttichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist	oder dem Prioritätsdatum ve Anmeldung nicht kollidiert, s	nach dem internationalen Anmeldedatum röffentlicht worden ist und mit der ondern nur zum Verständnis des der n Prinzips oder der ihr zugrundellegenden			
"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "Theorie angegeben ist "The						
ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach						
dem b	eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Abschlusses der internationalen Recherche	"&" Veröffentlichung, die Mitglied Absendedatum des internati				
	7. April 2000	08/05/2000	ormer reciterater percents			
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bedienstet	er			
	NL 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 3402040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 3403016	Bosma, P				

Int. Nonales Aktenzeichen
PCT/EP 99/08478

ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	99/08478		
	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US MONTGINOUL, C. ET AL: "Analgesic, anticonvulsant and anti-inflammatory activities of 1H,3H-quinazoline-2,4-diones" retrieved from STN Database accession no. 110:165551h XP002135868 see CAS RN 67116-39-6 & ANN. PHARM. FR. (1989), 46(4), 223-32,		13	
PASTOR, G. ET AL: "Synthesis of new 1H,3H-quinazoline-2,4-diones" BULLETIN DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE., Bd. 5-6, Nr. 2, 1975, Seiten 1331-1338, XP002135865 SOCIETE FRANCAISE DE CHIMIE. PARIS., FR ISSN: 0037-8968 Tabellen III,1E		13	
HARDTMANN, GOETZ E. ET AL: "Chemistry of 2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione (1satoic anhydrides). 1. Synthesis of N-substituted 2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-diones" JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY., Bd. 12, Nr. 3, 1975, Seiten 565-572, XP002135866 HETEROCORPORATION. PROVO., US ISSN: 0022-152X see compounds 65-88		13,14	
DE 26 52 144 A (MERCK PATENT GMBH) 18. Mai 1978 (1978-05-18) Ansprüche 1,9; Beispiel 2		14,15	
CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 85, no. 3, 19. Juli 1976 (1976-07-19) Columbus, Ohio, US; abstract no. 21433p, NODA, KANJI ET AL: "Quinazoline compounds" Seite 701; XP002135867 Zusammenfassung & JP 50 157383 A (HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., LTD., JAPAN) 19. Dezember 1975 (1975-12-19)		13	
	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US MONTGINOUL, C. ET AL: "Analgesic, anticonvulsant and anti-inflammatory activities of IH,3H-quinazoline-2,4-diones" retrieved from STN Database accession no. 110:165551h XP002135868 see CAS RN 67116-39-6 & ANN. PHARM. FR. (1989), 46(4), 223-32, PASTOR, G. ET AL: "Synthesis of new IH,3H-quinazoline-2,4-diones" BULLETIN DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE., Bd. 5-6, Nr. 2, 1975, Seiten 1331-1338, XP002135865 SOCIETE FRANCAISE DE CHIMIE. PARIS., FR ISSN: 0037-8968 Tabellen III,1E HARDIMANN, GOETZ E. ET AL: "Chemistry of 2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione (isatoic anhydrides). 1. Synthesis of N-substituted 2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-diones" JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY., Bd. 12, Nr. 3, 1975, Seiten 565-572, XP002135866 HETEROCORPORATION. PROVO., US ISSN: 0022-152X see compounds 65-88 DE 26 52 144 A (MERCK PATENT GMBH) 18. Mai 1978 (1978-05-18) Ansprüche 1,9; Beispiel 2 CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 85, no. 3, 19. Juli 1976 (1976-07-19) Columbus, Ohio, US; abstract no. 21433p, NODA, KANJI ET AL: "Quinazoline compounds" Seite 701: XP002135867 Zusammenfassung & JP 50 157383 A (HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., LTD., JAPAN)	Bezeichnung der Veröffertlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US MONTGINOUL, C. ET AL: "Analgesic, anticonvulsant and anti-inflammatory activities of IH, 3H-quinazoline-2, 4-diones" retrieved from STN Database accession no. 110:165551h XP002135868 see CAS RN 67116-39-6 & ANN. PHARM. FR. (1989), 46(4), 223-32, PASTOR, G. ET AL: "Synthesis of new 1H, 3H-quinazoline-2, 4-diones" BULLETIN DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE., Bd. 5-6, Nr. 2, 1975, Seiten 1331-1338, XP002135865 SOCIETE FRANCAISE DE CHIMIE. PARIS., FR ISSN: 0037-8968 Tabellen III,1E HARDTMANN, GOETZ E. ET AL: "Chemistry of 2H-3, 1-benzoxazine-2, 4(1H)-dione (isatoic anhydrides). 1. Synthesis of N-substituted 2H-3, 1-benzoxazine-2, 4(1H)-diones" JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY., Bd. 12, Nr. 3, 1975, Seiten 565-572, XP002135866 HETEROCORPORATION. PROVO., US ISSN: 0022-152X see compounds 65-88 DE 26 52 144 A (MERCK PATENT GMBH) 18. Mai 1978 (1978-05-18) Ansprüche 1,9; Beispiel 2 CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 85, no. 3, 19. Juli 1976 (1976-07-19) Columbus, Ohio, US; abstract no. 21433p, NODA, KANJI ET AL: "Quinazoline compounds" Seite 701; XP002135867 Zusammenfassung 8 JP 50 157383 A (HISAMITSU PHARMACEUTICAL CC., LTD., JAPAN)	

... cernationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/08478

Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)
Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt: 1. Ansprüche Nr. weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
2. X Ansprüche Nr. — weit sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich siehe Zusatzblatt WEITERE ANGABEN PCT/ISA/210
3. Ansprüche Nr. weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.
Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)
Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:
Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher- chenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen er- faßt:
Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt. Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Fortsetzung von Feld I.2

Die geltenden Patentansprüche 1-6 beziehen sich auf eine unverhältnismäßig große Zahl möglicher Verbindungen, von denen sich nur ein kleiner Anteil im Sinne von Art. 6 PCT auf die Beschreibung stützen und/oder als im Sinne von Art.5 PCT in der Patentanmeldung offenbart gelten kann. Im vorliegenden Fall fehlt den Patentansprüchen die entsprechende Stütze und fehlt der Patentanmeldung die nötige Offenbarung in einem solchen Maße, daß eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich erscheint. Daher wurde die Recherche auf die Teile der Patentansprüche gerichtet, welche im o.a. Sinne als gestützt und offenbart erscheinen, nämlich die Teile betreffend, die Verbindungen der Beispiele und die Verbindungen der allgemeinen Formel I, in der W für Sauerstoff steht.

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß Patentansprüche, oder Teile von Patentansprüchen, auf Erfindungen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer internationalen vorläufigen Prüfung sein können (Regel 66.1(e) PCT). In seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde wird das EPA also in der Regel keine vorläufige Prüfung für Gegenstände durchführen, zu denen keine Recherche vorliegt. Dies gilt auch für den Fall, daß die Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes geändert wurden (Art. 19 PCT), oder für den Fall, daß der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemäß Kapitel II PCT neue Patentanprüche vorlegt.

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Int. :onales Aktenzeichen
PCT/EP 99/08478

Im Recherchenberici ngeführtes Patentdoku		Datum der Veröffentlichung		fitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 3409668	Α	05-11-1968	FR GB	1458953 A 1057667 A	30-01-1967
DE 3406416	A	30-08-1984	AU DD DK EP GR JP US ZA	2507284 A 218890 A 77884 A 0117462 A 81797 A 59164779 A 4568687 A 8401447 A	06-09-1984 20-02-1985 29-08-1984 05-09-1984 12-12-1984 17-09-1984 04-02-1986 31-10-1984
EP 0564356	A	06-10-1993	FR AU CA CN FI HU JP MX NO ZA	2689508 A 3554693 A 2092852 A 1081438 A 931414 A 64752 A 6263743 A 9301882 A 931186 A 9302351 A	08-10-1993 07-10-1993 02-10-1993 02-02-1994 02-10-1993 28-02-1994 20-09-1994 30-06-1994 04-10-1993 03-10-1994
DE 2652144	Α	18-05-1978	KEIN	iE	
JP 50157383	Α	19-12-1975	JP JP	1177841 C 57044672 B	30-11-1983 22-09-1982